



«

»

2013-2014

# 11 класс

Соотнесение выставленных оценок с баллами

	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4	Задача 5	Задача 6
+	20	20	20	20	20	20
+	19	19	18	18	18	19
+/-	14	16	16	16	16	15
+2	10	12	12	12	12	10
-/+	4	8	8	8	10	8
-.	1	4	4	4	6	0
-	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

За каждое решение выставляется первичная оценка в виде одного из следующих знаков: (+), (+.), (+/-), (+/2), (-/+), (-), (-), (0), которая затем пересчитывается в итоговую оценку – от 0 до 20 баллов. Во всех задачах первичная оценка (0) ставится за отсутствие в беловике текста решения, оценка (-) ставится, если текст решения не соответствует ни одному из перечисленных ниже критериев.

- 11.1.** На координатной плоскости нарисовано множество точек, заданное уравнением  $x = y^2$ . Окружность радиуса 5 с центром в точке (11; 1) пересекает это множество в точках  $A, B, C$  и  $D$ . Докажите, что все точки  $A, B, C, D$  лежат на одной параболе, т.е. на кривой, задаваемой уравнением  $y = ax^2 + bx + c$ , и найдите уравнение этой параболы.

*Ответ.*  $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{21}{2}x + \frac{97}{2}$ .

*Решение.* Координаты точек  $A, B, C, D$  являются решениями системы

$$\begin{cases} y^2 = x \\ (x - 11)^2 + (y - 1)^2 = 25. \end{cases} \quad (1)$$

Раскрывая скобки во втором уравнении и подставляя  $y^2$  из первого, получаем

$$x^2 - 22x + 121 + x - 2y + 1 = 25 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{21}{2}x + \frac{97}{2}. \quad (2)$$

Поскольку уравнение (2) получено как следствие системы (1), любое решение системы (1) является решением уравнения (2). В частности координаты точек  $A, B, C, D$  являются решениями уравнения (2), т.е. парабола, задаваемая уравнением (2), проходит через точки  $A, B, C, D$ .

*Критерии.*

- (-) Правильно выписано уравнение окружности.
- (-/+ ) В процессе решения получено верное уравнение параболы, однако затем написаны лишние и некорректные рассуждения, приводящие к неверному ответу.
- (+/2) Ответ верный, обоснования нет,  
*или*  
В предположении, что нужная парабола существует, найдены только два из коэффициентов  $a, b, c$ . Существование параболы с нужными свойствами не доказано.
- (+/-) Получен верный ответ при предположении, что нужная парабола существует, однако ее существование либо не доказано, либо доказано с существенными пробелами,  
*или*  
уравнение  $x = y^2$  заменено на уравнение  $\sqrt{x} = y$ , других недочетов нет, ответ верный,  
*или*  
доказано, что точки  $A, B, C, D$  лежат на одной параболе, задаваемой уравнением  $y = ax^2 + bx + c$ , однако коэффициенты  $a, b, c$  не найдены.
- (+) Арифметическая ошибка в правильном решении.
- (+) В ответе явно выписано правильное уравнение параболы, и приведено корректное обоснование того, что эта парабола проходит через точки  $A, B, C, D$ .

**11.2.** Через вершины правильного шестиугольника проведены 6 различных параллельных прямых. Может ли оказаться так, что все попарные расстояния между этими прямыми являются целыми числами?

*Ответ.* Может.

*Решение.* Пусть  $ABCDEF$  — произвольный правильный шестиугольник. Проведём прямую  $m_A$  через вершину  $A$  и точку  $G$  — середину стороны  $BC$ . Через остальные вершины проведём прямые, параллельные  $m_A$ . Обозначим эти прямые  $m_B, m_C, \dots$ . Опустим перпендикуляры  $DS, CR, BP, CQ$  (см. рисунок).

Будем обозначать  $\rho(x, y)$  расстояние между прямыми  $x$  и  $y$ . Пусть  $\rho(m_A, m_B) = d$ . Тогда:

$$BG = CG \Rightarrow BP = CQ \Rightarrow \rho(m_A, m_C) = \rho(m_A, m_B) = d,$$


при симметрии относительно центра шестиугольника прямые  $m_A, m_B, m_C$  переходят соответственно в  $m_D, m_E, m_F$ , откуда  $\rho(m_D, m_E) = \rho(m_D, m_F) = d$ ,

$$\triangle FCR \sim \triangle EDS, FC = 2ED \Rightarrow \rho(m_C, m_F) = CR = 2DS = 2d.$$

Сделаем теперь гомотегию с коэффициентом  $\frac{1}{d}$ , (иначе говоря выберем сторону шестиугольника так, чтобы  $d = 1$ ). Тогда

$$\rho(m_D, m_E) = \rho(m_D, m_F) = \rho(m_A, m_C) = \rho(m_A, m_B) = 1, \quad \rho(m_F, m_C) = 2,$$

т.е. все попарные расстояния между прямыми — целые числа.



*Критерии.*

- (-) Правильный ответ, сопровождаемый правильным рисунком (с явным указанием равных или пропорциональных отрезков),  
или  
указано, что какие-то два расстояния между прямыми, симметричными относительно центра шестиугольника, можно сделать одновременно целыми.
- (-/+) Доказано, что два расстояния между несимметричными парами прямых можно сделать одновременно целыми.
- (+/2) Верный ход решения с логическими ошибками или недостаточными обоснованиями, не повлиявшими на ответ.
- (+/-) Верный ход решения с арифметической ошибкой, не повлиявшей на ответ.
- (+) Верное решение с незначительными недочётами.
- (+) Верное решение.

**11.3.** Последовательность  $a_n$  строится следующим образом:  $a_1, a_2$  — произвольные действительные числа, при  $n \geq 3$  число  $a_n$  равно наименьшему из чисел  $|a_i - a_j|$ ,  $1 \leq i < j \leq n - 1$ . Например, если  $a_1 = 6$ ,  $a_2 = \frac{19}{2}$ , то получаем последовательность  $6, \frac{19}{2}, \frac{7}{2}, \frac{5}{2}, 1, 1, 0, 0, 0, \dots$ . При некотором выборе  $a_1, a_2$  получилась последовательность, в которой  $a_{10} = 1$ . Найдите наименьшее возможное значение  $a_3$  в такой последовательности.

*Решение.* Пусть  $S_n$  — множество всех чисел  $|a_i - a_j|$ ,  $1 \leq i < j \leq n - 1$ ,  $n \geq 3$ . Тогда  $a_n$  есть наименьшее число из множества  $S_n$ . Поскольку  $S_n \subset S_{n+1}$ , то  $a_n \geq a_{n+1}$ , т.е. начиная с  $a_3$  последовательность нестрого убывающая. Следовательно  $a_9 \geq a_{10} = 1$ . Далее из определения последовательности следует  $a_{10} \leq |a_8 - a_9| = a_8 - a_9 \Rightarrow a_8 \geq a_9 + a_{10} \geq 2$ . Аналогично  $a_7 \geq a_8 + a_9 \geq 2 + 1 = 3$ ,  $a_6 \geq a_7 + a_8 \geq 3 + 2 = 5, \dots, a_3 \geq a_4 + a_5 \geq 13 + 8 = 21$ . Это значение достигается, если взять  $a_1 = 55$ ,  $a_2 = 34$ .

*Критерии.*

- (-) Строго доказано, что  $a_n \geq a_{n+1}$  при  $n \geq 3$ .
- (-/+) Ответ + неполный пример: сказано, что  $\min(a_3) = 21$ , и для этого случая выписаны все члены последовательности кроме  $a_1, a_2$ .
- (+/2) ответ+пример (включая  $a_1, a_2$ ),  
или  
доказано, что  $a_3 \geq 21$ , но при этом без доказательства использовано, что  $a_n \geq a_{n+1}$ , пример последовательности для  $a_3 = 21$  отсутствует,  
или  
ответ + неполный пример (без  $a_1, a_2$ ) + существенные продвижения в обосновании минимальности.
- (+/-) Строго без недочётов доказано, что  $a_3 \geq 21$ , пример отсутствует,  
или  
ответ + пример (включая  $a_1, a_2$ ) + обоснование минимальности с небольшими пробелами.
- (+) Логически верное и законченное решение с отсутствием каких-либо недочётов кроме следующих:
  - неполный пример (не выписаны явно  $a_1, a_2$ ),
  - используется без доказательства тот факт, что  $a_n \geq a_{n+1}$  при  $n \geq 3$ ,
  - допущена арифметическая ошибка при вычислении  $a_3$ .
- (+) Строго без недочётов доказано, что  $a_3 \geq 21$ , и явно выписаны  $a_1, a_2$ , при которых  $a_3 = 21$ .

**11.4.** Многогранник вписан в сферу радиуса  $R$ , а его объём численно равен площади его поверхности.

- a.** Докажите, что  $R > 3$ .  
**b.** Может ли  $R$  быть больше 1000?

*Решение.*

Решение пункта **a**:

Пусть  $O$  — центр сферы,  $S$  — площадь поверхности многогранника,  $V$  — его объём. Пронумеруем грани многогранника числами от 1 до  $n$ . Для каждого  $i$  можно образовать пирамиду с вершиной  $O$  и основанием, совпадающим с  $i$ -той гранью многогранника. Обозначим через  $V_i$  объём такой пирамиды, через  $S_i$  — площадь основания,  $h_i$  — высота, опущенная из  $O$  на основание. Тогда

$$V \leq \sum_{i=1}^n V_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{3} h_i S_i < \sum_{i=1}^n \frac{1}{3} R S_i = \frac{1}{3} R S.$$

Так как  $V = S$ , получаем, что  $1 < \frac{1}{3} R \Rightarrow R > 3$ .

Решение пункта **b**:

Может. Возьмём прямоугольный параллелепипед  $3000 \times 3000 \times x$ . Он вписан в сферу, очевидно, её радиус не меньше 1500. Осталось подобрать  $x$  так, чтобы объём был равен площади поверхности. Для этого достаточно, чтобы выполнялось равенство:

$$9000000x = 18000000 + 12000x.$$

Очевидно, при каком-то положительном  $x$  оно выполняется.

*Критерии.* Полное решение пункта **a** оценивается в 4 первичных балла, пункта **b** — в 2 первичных балла. Оценка задачи равна сумме баллов по обоим пунктам. Перевод в знаки осуществляется по таблице

0	1	2	3	4	5	6
0/−	−.	−/+	+/2	+/-	+.	+

Критерии за пункт **a**:

- 0: Центр сферы соединён с вершинами многогранника, других продвижений нет.
- 1: Требуемое неравенство доказано для частного случая (куб, призма, пирамида и т.д.)
- 2: Задача решена, но при решении использовано изопериметрическое неравенство,  
или  
в решении содержатся лишние и неверные утверждения, при исключении которых оставшаяся часть представляет собой верное и законченное решение. (Например сказано, что все получившиеся пирамиды — правильные.)
- 3: Упущен случай, когда центр сферы вне многогранника, в остальном всё верно.
- 4: Правильное без недочётов решение пункта **a**.

Критерии за пункт **b**:

- 0: Любые рассуждения без упоминания явного вида многогранника.
- 1: Указан конкретный вид многогранника (параллелепипед, призма и т.д.), и есть правильное но незавершённое (либо завершённое, но с ошибками) доказательство того, что при некоторых длинах рёбер требуемое равенство выполнено.
- 2: Правильное решение пункта **b**, возможно с арифметической ошибкой при подсчёте объёма или площади поверхности.

**11.5.** Пусть  $p > 2$  — целое число, не делящееся на 3. Докажите, что существуют такие целые числа  $a_1, a_2, \dots, a_k$ , что

$$-\frac{p}{2} < a_1 < a_2 < \dots < a_k < \frac{p}{2},$$

и произведение

$$\frac{p - a_1}{|a_1|} \cdot \frac{p - a_2}{|a_2|} \dots \frac{p - a_k}{|a_k|}$$

равно  $3^m$  для некоторого натурального  $m$ .

*Решение. ПЕРВЫЙ СПОСОБ.* Возьмём в качестве чисел  $a_i$  все числа из интервала  $(-\frac{p}{2}, \frac{p}{2})$  такие, что  $p \equiv a_i \pmod{3}$ . Докажем, что они удовлетворяют условию задачи. Заметим следующее:

- Все числа  $|a_i|$  принадлежат интервалу  $(0, \frac{p}{2})$ .
- Все числа  $|a_i|$  различны. Действительно, если  $a_i = -a_j$  при некоторых  $i, j$ , то  $a_i + a_j = 0 \Rightarrow 2p = 0 \pmod{3}$  — противоречие.
- Любое число из интервала  $(0, \frac{p}{2})$ , не делящееся на 3, совпадает с одним из чисел  $|a_i|$ . Действительно, пусть  $t \in (0, \frac{p}{2})$ ,  $t \not\equiv 0 \pmod{3}$ . Тогда либо  $t \equiv p \pmod{3}$ , либо  $-t \equiv p \pmod{3}$  и, следовательно, одно из чисел  $\pm t$  совпадает с одним из  $a_i$ . Из  $\pm t = a_i$  и  $t > 0$  следует  $t = |a_i|$ .

Итак, множество чисел  $|a_i|$  совпадает с множеством всех чисел из интервала  $(0, \frac{p}{2})$ , не делящихся на 3.

Далее, пусть  $3^{\gamma_i}$  — максимальная степень тройки, делящая  $(p - a_i)$ , т.е.

$$p - a_i = 3^{\gamma_i} \cdot b_i, \quad b_i \not\equiv 0 \pmod{3}.$$

Из  $p \equiv a_i \pmod{3}$  следует  $\gamma_i > 0$ . Заметим следующее:

- Все числа  $b_i$  принадлежат интервалу  $(0, \frac{p}{2})$ . Действительно,

$$-\frac{p}{2} < a_i < \frac{p}{2} \Rightarrow \frac{p}{2} < p - a_i < \frac{3p}{2} \Rightarrow 0 < \frac{p - a_i}{3^{\gamma_i}} < \frac{p}{2}.$$

- Все числа  $b_i$  различны. Действительно, пусть  $b_i = b_j$  при некоторых  $i, j$ . Поскольку  $p - a_i \neq p - a_j$ , отсюда следует  $\gamma_i \neq \gamma_j$ . Пусть  $\gamma_i > \gamma_j$ . Тогда

$$\frac{p - a_i}{p - a_j} = \frac{3^{\gamma_i} \cdot b_i}{3^{\gamma_j} \cdot b_j} = 3^{\gamma_i - \gamma_j} \geq 3.$$

С другой стороны  $\frac{p}{2} < p - a_j$ ,  $\frac{3p}{2} > p - a_i \Rightarrow \frac{p - a_i}{p - a_j} < 3$  — противоречие.

- Любое число из интервала  $(0, \frac{p}{2})$ , не делящееся на 3, совпадает с одним из чисел  $b_i$ . Действительно, пусть  $t \in (0, \frac{p}{2})$ ,  $t \not\equiv 0 \pmod{3}$ . Тогда существует такое  $\gamma \in \mathbb{N}$ , что  $t \cdot 3^\gamma \in (\frac{p}{2}, \frac{3p}{2}) \Rightarrow p - t \cdot 3^\gamma \in (-\frac{p}{2}, \frac{p}{2})$ , и при этом  $p - t \cdot 3^\gamma \equiv p \pmod{3}$ , следовательно  $p - t \cdot 3^\gamma = a_i$  при некотором  $i$ . Но тогда  $t \cdot 3^\gamma = p - a_i \Rightarrow t = b_i$ .

Итак, множество чисел  $b_i$  совпадает с множеством всех чисел из интервала  $(0, \frac{p}{2})$ , не делящихся на 3 и, следовательно, совпадает с множеством чисел  $|a_i|$ . Отсюда получаем

$$\frac{p - a_1}{|a_1|} \cdot \frac{p - a_2}{|a_2|} \dots \frac{p - a_k}{|a_k|} = \frac{3^{\gamma_1 + \dots + \gamma_k} \cdot b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_k}{|a_1| \cdot \dots \cdot |a_k|} = 3^{\gamma_1 + \dots + \gamma_k},$$

что и требовалось.

*ВТОРОЙ СПОСОБ.* Из условия следует, что  $p$  — число вида  $6n \pm 1$ ,  $6n \pm 2$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Рассмотрим случай  $p = 6n + 1$ , в остальных случаях вычисления аналогичны.

Положим  $a_i = 3n + 1 - 3i$ ,  $i = 1, 2, \dots, 2n$ . Тогда  $\frac{p}{2} > 3n - 2 = a_1 > a_2 > \dots > a_{2n} = -3n + 1 > -\frac{p}{2}$ . Вычислим значение выражения:

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{2n} \frac{p - a_i}{|a_i|} &= \prod_{i=1}^{2n} \frac{6n + 1 - (3n + 1 - 3i)}{|3n + 1 - 3i|} = 3^{2n} \prod_{i=1}^{2n} \frac{n + i}{|3n + 1 - 3i|} = \\ &= \frac{3^{2n} \cdot \prod_{i=1}^{2n} (n + i)}{\prod_{i=1}^{2n} |3n + 1 - 3i|} = \frac{3^{2n} \cdot (3n)!}{n! \cdot \prod_{i=1}^n (3n + 1 - 3i) \prod_{i=n+1}^{2n} (3i - 3n - 1)} = \\ &= \frac{3^{3n} \cdot (3n)!}{\prod_{i=1}^n (3i) \cdot \prod_{i=1}^n (3i - 2) \prod_{i=1}^n (3i - 1)} = \frac{3^{3n} \cdot (3n)!}{(3n)!} = 3^{3n}. \end{aligned}$$

*Критерии.*

- (-) Замечено, что числа из интервала  $(-\frac{p}{2}, \frac{p}{2})$  такие, что  $p \equiv a_i \pmod{3}$ , дают решение задачи .
- (+) Явно разобран один из случаев  $p = 6n \pm 1, 6n \pm 2$ .



**11.6.** На клетчатой доске размером  $2 \times n$  клеток некоторые клетки закрашиваются в чёрный цвет. Раскраска называется правильной, если среди закрашенных нет двух соседних клеток. (Соседними называются клетки, имеющие общую сторону.) Раскраска, в которой ни одна клетка не закрашена, тоже считается правильной.

Пусть  $A_n$  — количество правильных раскрасок с чётным числом закрашенных клеток,  $B_n$  — количество правильных раскрасок с нечётным числом закрашенных клеток. Найти все возможные значения  $A_n - B_n$ .

*Ответ.*  $\pm 1$ .

*Решение.* Рассмотрим клетчатые доски двух видов: обычная доска  $F_n$  размера  $2 \times n$ , и доска  $G_n$  размера  $2 \times n$ , в которой удалена одна угловая клетка. Помимо величин  $A_n$  и  $B_n$  введём величины  $C_n$  и  $D_n$  — количество правильных раскрасок доски  $G_n$  с чётным и нечётным количеством закрашенных клеток.

Клетки будем нумеровать как в шахматах:  $a_i, b_i$ , где  $a, b$  — буквы, соответствующие рядам,  $i \in \{1, \dots, n\}$  — номера столбцов. Пусть на доске  $F_n$  ( $n \geq 2$ ) правильно раскрашено чётное количество клеток. Множество таких раскрасок разбивается на три подмножества: 1) клетка  $a_n$  закрашена, 2) клетка  $b_n$  закрашена, 3) ни одна из клеток  $a_n, b_n$  не закрашена.

Если закрашена клетка  $a_n$ , то клетки  $a_{n-1}$  и  $b_n$  обязаны быть не закрашенными, а среди остальных правильным образом должны быть закрашены нечётное количество клеток. Значит, количество раскрасок, соответствующих случаю 1) (а так же и случаю 2)), равно  $D_{n-1}$ .

Если ни одна из клеток  $a_n, b_n$  не закрашена, то среди остальных правильным образом должны быть закрашены чётное количество клеток. Количество таких раскрасок равно  $A_{n-1}$ . В итоге получаем

$$A_n = A_{n-1} + 2D_{n-1}.$$

Аналогичным рассуждением получаем

$$B_n = B_{n-1} + 2C_{n-1},$$

$$C_n = A_{n-1} + D_{n-1},$$

$$D_n = B_{n-1} + C_{n-1}.$$

Обозначим  $P_n = A_n - B_n$ ,  $Q_n = C_n - D_n$ . Тогда, вычитая полученные выше равенства, получаем

$$P_n = P_{n-1} - 2Q_{n-1}, \quad Q_n = P_{n-1} - Q_{n-1}.$$

Вычисляя начальные значения  $P_1 = -1$ ,  $Q_1 = 0$ , находим последовательно

$i$	1	2	3	4	5
$P_i$	-1	-1	1	1	-1
$Q_i$	0	-1	0	1	0.

Далее последовательность становится периодической. Отсюда видно, что искомая величина  $P_n$  принимает только значения  $\pm 1$ .

*Критерии.*

- (-) Правильный ответ на основании нескольких примеров.
- (-/+) Правильный ответ с ошибками в обосновании рекурсии.
- (+/2) Правильный ответ с заметными пробелами в обосновании рекурсии.
- (+/-) Правильный ответ (или  $\{0, -2\}$ ) с небольшими недочётами в обосновании рекурсии.
- (+.) Забыта пустая раскраска, изза чего получен ответ  $\{0, -2\}$ , в остальном всё верно.
- (+) Правильный ответ с полным обоснованием.