

## Решение задач 11 класс

1. (2 балла) Для многочлена  $(x^2 - x + 1)^{100}$  найдите сумму коэффициентов при четных степенях  $x$ .

**Решение:** Пусть  $P(x) = (x^2 - x + 1)^{100}$ . Искомая сумма равна

$$\frac{P(1) + P(-1)}{2} = \frac{1 + 3^{100}}{2}$$

Ответ:  $\frac{1 + 3^{100}}{2}$

2. (2 балла) Про числа  $x_1$  и  $x_2$  известно, что  $x_1 + x_2 = 2\sqrt{1703}$  и  $|x_1 - x_2| = 90$ . Найдите  $x_1 \cdot x_2$ .

**Решение:** Обозначим  $A = x_1 + x_2$ ,  $B = x_1 \cdot x_2$ ,  $C = |x_1 - x_2|$ . Поскольку

$$C^2 = A^2 - 4 \cdot B, \text{ находим } B = -322.$$

Ответ: -322.

3. (3 балла) Найти количество целых чисел от 1 до 1000 включительно, дающие одинаковый остаток от деления на 11 и на 12.

**Решение.** Обозначим  $r_n(a)$  - остаток от деления числа  $a$  на число  $n$ . Пусть  $a \in [1; 1000]$  и  $r_{11}(a) = r_{12}(a) = t$ . Тогда  $t \in \{0, \dots, 10\}$  и выполняется равенство

$$t + 11k = t + 12m = a, \quad k, m \in N_0.$$

Из последнего равенства следует, что  $k$  делится на 12, а  $m$  делится на 11. Значит,

$$t + 11 \cdot 12 \cdot s = t + 132 \cdot s = a, \quad s \in N_0.$$

Осталось учесть условие  $a = t + 132 \cdot s \leq 1000$ ,  $t \in \{0, \dots, 10\}$ :

$$\begin{aligned}
t=0 &\Rightarrow 132s \leq 1000 \Rightarrow s \leq 7,6 \Rightarrow 7 \text{ чисел } (s \neq 0) \\
t=1 &\Rightarrow 1+132s \leq 1000 \Rightarrow s \leq 7,57 \Rightarrow 8 \text{ чисел} \\
t=2 &\Rightarrow 2+132s \leq 1000 \Rightarrow s \leq 7,56 \Rightarrow 8 \text{ чисел} \\
t=3 &\Rightarrow 3+132s \leq 1000 \Rightarrow s \leq 7,55 \Rightarrow 8 \text{ чисел} \\
t=4 &\Rightarrow 4+132s \leq 1000 \Rightarrow s \leq 7,55 \Rightarrow 8 \text{ чисел} \\
t=5 &\Rightarrow 5+132s \leq 1000 \Rightarrow s \leq 7,54 \Rightarrow 8 \text{ чисел} \\
t=6 &\Rightarrow 6+132s \leq 1000 \Rightarrow s \leq 7,54 \Rightarrow 8 \text{ чисел} \\
t=7 &\Rightarrow 7+132s \leq 1000 \Rightarrow s \leq 7,53 \Rightarrow 8 \text{ чисел} \\
t=8 &\Rightarrow 8+132s \leq 1000 \Rightarrow s \leq 7,52 \Rightarrow 8 \text{ чисел} \\
t=9 &\Rightarrow 9+132s \leq 1000 \Rightarrow s \leq 7,51 \Rightarrow 8 \text{ чисел} \\
t=10 &\Rightarrow 10+132s \leq 1000 \Rightarrow s \leq 7,5 \Rightarrow 8 \text{ чисел}
\end{aligned}$$

Всего получаем 87 чисел. (очевидно, что последний перебор можно было бы и сократить)

Ответ: 87 чисел.

**P.S.** Альтернативный подход состоит в переборе  $s$ , где  $s \leq \frac{1000}{132} \approx 7,57$ , и нахождении тех  $t \in \{0, \dots, 10\}$ , для которых выполняется неравенство  $a = t + 132 \cdot s \leq 1000$

4. (4 балла) При подготовке к экзамену три школьника решали 100 задач. Каждый школьник решил по 60 задач, причем каждую задачу кто-нибудь решил. Задача считается трудной, если ее решил только один школьник. Легкой считается задача, которую решили все три школьника. Каких задач больше – легких или трудных? Насколько?

**Решение.** Пусть

$x_i$  - количество задач, решенных только  $i$ -м учеником,

$y_{i,j}$  - количество задач, решенных только  $i$ -м и  $j$ -м учеником,

$z$  - количество задач, решенных всеми учениками (число легких задач)

Тогда число трудных задач равно  $x_1 + x_2 + x_3$ .

По условию имеем систему из четырех линейных уравнений относительно 7 неизвестных

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + y_{1,2} + y_{1,3} + y_{2,3} + z = 100 \\ x_1 + y_{1,2} + y_{1,3} + z = 60 \\ x_2 + y_{1,2} + y_{2,3} + z = 60 \\ x_3 + y_{1,3} + y_{2,3} + z = 60 \end{cases}$$

Из этой системы можно найти, что  $x_1 + x_2 + x_3 - z = 20$ . Последнее равенство и дает ответ задачи.

Ответ: трудных задач на 20 штук больше, чем легких.

**Другое решение** состоит в применении формулы включения-исключения для подсчета мощности объединения трех множеств

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |C \cap B| + |A \cap B \cap C|.$$

Здесь  $A$  - множество задач, решенных 1-м учеником,  $|A| = 60$

$B$  - множество задач, решенных 2-м учеником,  $|B| = 60$

$C$  - множество задач, решенных 3-м учеником,  $|C| = 60$

$A \cap B \cap C$  - - множество задач, решенных всеми учениками (множество легких задач),

$A \cup B \cup C$  - множество всех задач,  $|A \cup B \cup C| = 100$ .

Тогда множество трудных задач описывается равенством

$$(A \cup B \cup C) \setminus ((A \cap B) \cup ((A \cap C) \setminus (A \cap B \cap C)) \cup ((B \cap C) \setminus (A \cap B \cap C)))$$

Мощность данного множества равна

$$\begin{aligned} & |A \cup B \cup C| - |A \cap B| - (|A \cap C| - |A \cap B \cap C|) - (|B \cap C| - |A \cap B \cap C|) = \\ & = |A \cup B \cup C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + 2|A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

С учетом формулы включения – исключения получаем, что количество трудных задач равно

$$\begin{aligned} & 2|A \cup B \cup C| - |A| - |C| - |B| + |A \cap B \cap C| = \\ & = 200 - 180 + |A \cap B \cap C| = 20 + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

Значит, трудных задач на 20 штук больше, чем легких.

5. (5 баллов) Решите неравенство  $\log_{\cos x} (x^2 - 6x - 2) > \frac{2}{\log_5 \cos x}$ .

Решение:

О.Д.З.

$$\begin{cases} x^2 - 6x - 2 > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 3 - \sqrt{11}) \cup (3 + \sqrt{11}, +\infty) \\ 0 < \cos x < 1 \Leftrightarrow x \in \left(2\pi k - \frac{\pi}{2}, 2\pi k\right) \cup \left(2\pi k, 2\pi k + \frac{\pi}{2}\right), k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$\log_{\cos x} (x^2 - 6x - 2) > \frac{2}{\log_5 \cos x} \Leftrightarrow \log_{\cos x} (x^2 - 6x - 2) > \log_{\cos x} 25 \Leftrightarrow$  (с учетом О.Д.З.)




$$x^2 - 6x - 2 < 25 \Leftrightarrow x \in (-3; 9).$$

Контроль О.Д.З. :

Ответ:  $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 3 - \sqrt{11}\right) \cup \left(3 + \sqrt{11}, \frac{5\pi}{2}\right)$ .

6. (5 баллов). Точка  $D$  лежит на продолжении стороны  $AC$  треугольника  $ABC$ , площадь которого равна  $S$ ; при этом точка  $A$  находится между  $D$  и  $C$ . Пусть  $O$  – точка пересечения медиан треугольника  $ABC$ . Известно, что площадь треугольника  $DOC$  равна  $S_1$ . Выразите площадь треугольника  $DOB$  через  $S$  и  $S_1$ .

**Решение:** Покажем, что



$$S_{\triangle DOC} + S_{\triangle DOA} = S_{\triangle DOB} \quad (*)$$

Для этого (поскольку эти треугольники имеют общую сторону  $DO$ ) достаточно показать, что длины перпендикуляров, опущенных на  $DO$  из вершин треугольника, удовлетворяют равенству

$$h_1 + h_3 = h_2 \quad (**)$$

Действительно,  $h_1' = (h_1 + h_3) / 2$  (свойство средней линии трапеции), а из подобия отмеченных серым треугольников следует, что  $h_2 = 2h_1'$  (медианы точкой пересечения делятся в отношении 2:1, считая от вершины). Отсюда вытекает справедливость (\*\*).

Поскольку  $S_{\triangle DOC} = S_{\triangle DOA} + S_{\triangle AOC}$ , а  $S_{\triangle AOC} = \frac{S}{3}$ , получаем

$$\text{Ответ: } S_{\triangle DOB} = 2S_1 - \frac{S}{3}.$$