


Вариант 1

1.8. Приведите структурную формулу кислоты, в состав которой входит анион EO_4^- , содержащий 50 электронов. Укажите степень окисления атома Э (6 баллов).

Решение. $Z = 50 - (4 \cdot 8 + 1) = 17$, элемент Э – хлор, анион – ClO_4^- . В состав хлорной кислоты HClO_4 входит Cl^{+7} . Структурная формула кислоты:




2.3. Представьте в общепринятом виде и назовите соединение $\text{CH}_2\text{Zn}_2\text{O}_5$ (6 баллов).

Ответ: $[\text{Zn}(\text{OH})_2]\text{CO}_3$ – основной карбонат цинка или гидроксокарбонат цинка.

3.1. При смешении 200 мл раствора перхлората натрия с концентрацией 0.2 моль/л и 300 мл раствора хлорида калия с концентрацией 0.3 моль/л выпал осадок KClO_4 . Определите его массу, если произведение растворимости KClO_4 составляет $1.1 \cdot 10^{-2}$, объемом осадка можно пренебречь (8 баллов).

Решение. Происходит реакция



Исходные количества солей составляют

$$\begin{aligned} v(\text{NaClO}_4) &= c \cdot V = 0.2 \cdot 0.2 = 0.04 \text{ моль;} \\ v(\text{KCl}) &= 0.3 \cdot 0.3 = 0.09 \text{ моль.} \end{aligned}$$

Объем полученного раствора равен $0.2 + 0.3 = 0.5$ л (объемом образовавшегося осадка пренебрегаем).

Пусть выпало x моль осадка KClO_4 . Тогда произведение концентраций ионов K^+ и ClO_4^- в насыщенном растворе над осадком должно равняться произведению растворимости KClO_4 , которое является постоянной величиной:

$$\text{ПР} = [\text{K}^+][\text{ClO}_4^-] = \frac{(0.09 - x)}{0.5} \cdot \frac{(0.04 - x)}{0.5} = 1.1 \cdot 10^{-2}.$$

Получилось квадратное уравнение:

$$\begin{aligned} x^2 - 0.13x + 0.00085 &= 0. \\ D &= 0.0169 - 0.0034 = 0.0135. \\ x_{1,2} &= \frac{0.13 \pm 0.1162}{2} \end{aligned}$$

Корни уравнения: $x_1 = 0.1231$ и $x_2 = 0.0069$ (моль).


Первый корень не подходит, т. к. $0.1231 > 0.04$ и итоговая концентрация перхлорат-аниона окажется отрицательной. Значит, количество KClO_4 составляет 0.0069 моль, его масса равна

$$m(\text{KClO}_4) = v \cdot M = 0.0069 \cdot 138.5 = 0.956 \text{ г.}$$

Ответ: 0.956 г перхлората калия.

4.2. При сгорании смеси двух органических соединений образуются только углекислый газ и вода. Общая масса продуктов сгорания равна 32 г, а массовая доля водорода в ней – 5%. Установите качественный и количественный состав исходной смеси, если известно, что массовая доля углерода в ней составляет 40% (8 баллов).

Решение. По условию, в составе органических соединений могут находиться только углерод, водород и кислород:



Если $\omega(\text{H}) = 5\%$, тогда $m(\text{H}) = 0.05 \cdot 32 = 1.6$ г и $v(\text{H}) = 1.6$ моль; $m(\text{H}_2\text{O}) = 0.8 \cdot 18 = 14.4$ г.

Тогда $m(\text{CO}_2) = 32 - 14.4 = 17.6$ г, $v(\text{CO}_2) = 17.6 / 44 = 0.4$ моль и $v(\text{C}) = 0.4$ моль.

Важный вывод: $v(\text{C}) : v(\text{H}) = 0.4 : 1.6 = 1 : 4$.

Такое соотношение возможно только при $x = 1$, $y = 4$, следовательно, единственно возможные исходные вещества – это метан CH_4 и метанол CH_3OH .

Пусть $v(CH_4) = n$, $v(CH_3OH) = m$, тогда $n + m = 0.4$, т. к. $v(C) = 0.4$ моль:

$$0.4 = (12n + 12m)/(16n + 32m),$$

$$7n = m,$$

$$n = 0.05, m = 0.35,$$


$$v(CH_4) = 0.05 \text{ моль}, v(CH_3OH) = 0.35 \text{ моль},$$

$$m(CH_4) = 0.8 \text{ г}, m(CH_3OH) = 11.2 \text{ г}.$$


Ответ: $m(CH_4) = 0.8 \text{ г}$, $m(CH_3OH) = 11.2 \text{ г}$.

5.6. Навеску смеси нитрата ртути (II) и нитрата алюминия 22.53 г прокалили при температуре выше 400°C. Полученная в результате газовая смесь была пропущена через раствор гидроксида калия. Объем прошедшего через раствор газа (непоглотившегося) составил 366 мл (при $T = 298 \text{ К}$ и $p = 1 \text{ атм.}$). Рассчитайте массовые доли веществ в исходной навеске (*10 баллов*).

Решение. Разложение газовой смеси при прокаливании:



Поглощение газовой смеси раствором щелочи в присутствии кислорода:



Газ, прошедший через щелочь, – это избыток O_2 , его количество:

$$v(\text{O}_2)_{\text{ост}} = \frac{p \cdot V}{R \cdot T} = \frac{0.366}{0.082 \cdot 298} = 0.015 \text{ моль } \text{O}_2 \text{ не прореагировало.}$$

$$v(\text{O}_2)_{\text{ост}} = (0.75y + x) - 0.25(3y + 2x) = 0.5x.$$

$$x = 0.03 \text{ моль.}$$

$$v(\text{Hg}(\text{NO}_3)_2) = 0.03 \text{ моль,}$$

$$m(\text{Hg}(\text{NO}_3)_2) = 0.03 \cdot 325 = 9.75 \text{ г,}$$


$$\omega(\text{Hg}(\text{NO}_3)_2) = 9.75 / 22.53 = 0.43 \text{ (или 43%),}$$

$$\omega(\text{Al}(\text{NO}_3)_3) = 0.57 \text{ (или 57%).}$$


Ответ: $\omega(\text{Hg}(\text{NO}_3)_2) = 43\%$, $\omega(\text{Al}(\text{NO}_3)_3) = 57\%$.

6.1. При сжигании газовой смеси этана и метана выделилось 8250 Дж тепла. Продукты сгорания были последовательно пропущены через хлоркальциевую трубку и 1 л дистиллированной воды, при этом масса хлоркальциевой трубы увеличилась на 306 мг. Рассчитайте pH водного раствора, если $K_d(\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-) = 4.27 \cdot 10^{-7}$, а теплоты сгорания этана и метана равны 1561 кДж/моль и 891 кДж/моль соответственно (*10 баллов*).

Решение. Реакции сгорания веществ:



$$x \text{ моль} \qquad x \qquad 2x$$



$$y \text{ моль} \qquad 2y \qquad 3y$$

Масса хлоркальциевой трубы увеличилась за счет поглощения паров воды, следовательно $m(\text{H}_2\text{O}) = 0.306 \text{ г}$, $v(\text{H}_2\text{O}) = 0.306 / 18 = 0.017 \text{ моль}$. Составим и решим систему уравнений:


$$\begin{cases} 891x + 1561y = 8.25 \\ 2x + 3y = 0.017 \end{cases}$$

$$x = 0.004 \text{ моль, } y = 0.003 \text{ моль.}$$

Значит, в результате сгорания образовалось $v(\text{CO}_2) = x + 2y = 0.004 + 2 \cdot 0.003 = 0.01 \text{ моль}$. Углекислый газ поглощается водой: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3^-$.

$$c(\text{H}_2\text{CO}_3^-)_{\text{исх}} = v / V = 0.01 \text{ моль/л.}$$

В результате диссоциации угольной кислоты



$$0.01-z \qquad z \qquad z$$


$$K_{\text{дис}} = \frac{[\text{H}^+][\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = \frac{z^2}{0.01 - z} \approx \frac{z^2}{0.01} = 4.27 \cdot 10^{-7}$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{0.01 \cdot 4.27 \cdot 10^{-7}} = 6.535 \cdot 10^{-5} \text{ моль/л},$$








$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+] = 4.2.$$

Ответ: pH = 4.2.


7.1. Расшифруйте следующую схему превращений, напишите уравнения соответствующих реакций, укажите условия их протекания. Приведите структурные формулы соединений **A-Г**:




Решение. Один из возможных вариантов решения:








Другой вариант:



8.7. Напишите уравнения реакций приведенных ниже превращений и укажите условия их проведения (**X** – вещество, содержащее марганец, **Y** – вещество, содержащее серу):





Решение. Один из возможных вариантов:



Ответ: **X** – K_2MnO_4 , **Y** – S.

9.7. В результате реакции карбоновой кислоты с пропанолом-2 получено 28 г сложного эфира с выходом 70%. При полной нейтрализации такого же количества этой кислоты водным раствором гидроксида калия образовалось 38.4 г соли. Установите возможную формулу карбоновой кислоты. Что происходит с этой кислотой и ее изомером при нагревании до 150°C? Напишите уравнения протекающих реакций (14 баллов).

Решение. Карбоновая кислота может быть одноосновной или многоосновной. Обозначим основность кислоты через n . Реакции кислоты со спиртом и щелочью:



$$m(\text{эфира})_{\text{теор.}} = 28 / 0.7 = 40 \text{ г.}$$

$$v(\text{кислоты}) = v(\text{соли}) = v(\text{эфира})$$


$$m(\text{соли}) / M(\text{соли}) = m(\text{эфира}) / M(\text{эфира}).$$

Пусть молярная масса радикала R равна x , тогда:

$$38.4/(x + 83n) = 40/(x + 87n),$$

$$x = 13n.$$

При $n = 1$ $x = 13$ (такого радикала нет), при $n = 2$ $x = 26$, этому соответствует радикал $-CH=CH-$, тогда кислота – малеиновая или фумаровая (*цис*- или *транс*-изомер):



10.3. При взаимодействии двух простых веществ, одно из которых светло-желтый газ с относительной плотностью по фтороводороду 1.9, получается светло-жёлтая жидкость. Массовая доля более тяжёлого элемента в полученном соединении равна 58.39%. Полученное жидкое вещество активно взаимодействует с раствором гидроксида натрия. При электролизе полученного раствора с диафрагмой (продукты электролиза не взаимодействуют с раствором) масса продуктов, выделившихся на аноде до начала выделения кислорода, равна $M_Z 1.72$ г. Рассчитайте максимальную массу порции сульфита натрия, которая может быть окислена полученным раствором (14 баллов).

Решение. Одно из реагирующих веществ определяем по его молярной массе:

$$M = D_{HF} \cdot M(HF) = 1.9 \cdot 20 = 38 \text{ г/моль}, \text{ это } F_2 \text{ (светло-желтый газ).}$$

Поскольку фтор – сильнейший из неорганических окислителей, то взаимодействующее с ним вещество является восстановителем. Обозначим второе простое вещество-восстановитель как Z , тогда



Предположим, что фтор в полученном веществе ZF_n является более легким элементом. В таком случае по условию задачи:


$$\omega(Z) = \frac{M_Z}{M_Z + 19n} = 0.5839, \text{ отсюда } M_Z = 26.7n.$$

Если $n = 1$, то $M_Z = 26.7$ г/моль – такого элемента со степенью окисления (+1) нет.


Если $n = 2$, то $M_Z = 53.3$ г/моль – такого элемента тоже нет.

Если $n = 3$, то $M_Z = 80$ г/моль – это Br.


Тогда реакция взаимодействия двух простых веществ:



При взаимодействии со щелочью происходит реакция диспропорционирования Br^{3+} с образованием x моль NaBr , $9x$ моль NaF и $2x$ моль NaBrO_3 :



При электролизе полученного раствора на аноде будут окисляться только бромид ионы:




Масса выделившегося на аноде брома составляет

$$m(\text{Br}_2) = 0.5x \cdot 160 = 1.72,$$

отсюда $x = 0.0215$ моль.

Сульфит натрия будет окислен броматом натрия NaBrO_3 , которого в растворе содержится $2x = 2 \cdot 0.0215 = 0.043$ моль:



Отсюда $v(\text{Na}_2\text{SO}_3) = 3v(\text{NaBrO}_3) = 3 \cdot 0.043 = 0.129$ моль,

$$m(\text{Na}_2\text{SO}_3) = 0.129 \cdot 126 = 16.25 \text{ г.}$$

Ответ: 16.25 г.

Вариант 2

1.2. Приведите структурную формулу кислоты, в состав которой входит анион EO_2^- , содержащий 34 электрона. Укажите степень окисления атома Э (6 баллов).

Решение: $Z = 34 - (2 \cdot 8 + 1) = 17$, элемент Э – хлор, анион – ClO_2^- . В состав хлорноватой кислоты HClO_2 входит Cl^{+3} . Структурная формула кислоты:




2.1. Представьте в общепринятом виде и назовите соединение $\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_4\text{Cu}$ (6 баллов).

Ответ: $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4](\text{OH})_2$ гидроксид тетраамминмеди(II).

3.4. При смешении 200 мл раствора бромата натрия с концентрацией 0.5 моль/л и 100 мл раствора хлорида рубидия с концентрацией 0.25 моль/л выпал осадок RbBrO_3 . Определите его массу, если произведение растворимости RbBrO_3 составляет $2.0 \cdot 10^{-2}$, объемом осадка можно пренебречь (8 баллов).

Решение. Происходит реакция



Исходные количества солей составляют

$$v(\text{NaBrO}_3) = c \cdot V = 0.5 \cdot 0.2 = 0.1 \text{ моль};$$

$$v(\text{RbCl}) = 0.25 \cdot 0.1 = 0.025 \text{ моль}.$$

Объем образовавшегося раствора равен $0.2 + 0.1 = 0.3$ л (объемом образовавшегося осадка пренебрегаем).

Пусть выпало x моль осадка RbBrO_3 . Тогда произведение концентраций ионов Rb^+ и BrO_3^- в растворе должно равняться произведению растворимости RbBrO_3 :

$$\text{ПР} = [\text{Rb}^+][\text{BrO}_3^-] = \frac{(0.1-x)}{0.3} \cdot \frac{(0.025-x)}{0.3} = 2.0 \cdot 10^{-2}.$$

Получилось квадратное уравнение:

$$x^2 - 0.125x + 0.0007 = 0.$$

$$D = 0.0156 - 0.0028 = 0.0128.$$

$$x_{1,2} = \frac{0.125 \pm 0.113}{2}$$

Корни уравнения: $x_1 = 0.0628$ и $x_2 = 0.006$ (моль).


Первый корень не подходит, т. к. $0.0628 > 0.025$ и итоговая концентрация бромат-аниона окажется отрицательной. Значит, количество RbBrO_3 составляет 0.006 моль, его масса равна

$$m(\text{RbBrO}_3) = v \cdot M = 0.006 \cdot 213 = 1.28 \text{ г.}$$

Ответ: 1.28 г бромата рубидия.

4.3. При сгорании смеси двух органических соединений образуются только углекислый газ и вода. Общая масса продуктов сгорания равна 24 г, а массовая доля углерода в ней – 15%. Установите качественный и количественный состав исходной смеси, если известно, что массовая доля водорода в ней составляет 15% (8 баллов).

Решение. По условию, в составе органических соединений могут находиться только углерод, водород и кислород:



Если $\omega(\text{C}) = 15\%$, тогда $m(\text{C}) = 0.15 \cdot 24 = 3.6$ г, $v(\text{C}) = 0.3$ моль, $m(\text{CO}_2) = 13.2$ г.

Тогда $m(\text{H}_2\text{O}) = 10.8$ г, $v(\text{H}_2\text{O}) = 0.6$ моль, $v(\text{H}) = 0.12$ моль.

Важный вывод: $v(\text{C}) : v(\text{H}) = 0.3 : 0.12 = 1 : 4$. Такое соотношение возможно только при $x = 1$, $y = 4$, следовательно, единственны возможные исходные вещества – это метан CH_4 и метанол CH_3OH .

Пусть $v(\text{CH}_4) = n$, $v(\text{CH}_3\text{OH}) = m$, тогда $n + m = 0.3$, т. к. $v(\text{C}) = 0.3$ моль:

$$0.15 = (4n + 4m)/(16n + 32m),$$

$$2n = m,$$

$$n = 0.1, m = 0.2,$$


$$v(CH_4) = 0.1 \text{ моль}, v(CH_3OH) = 0.2 \text{ моль},$$

$$m(CH_4) = 1.6 \text{ г}, m(CH_3OH) = 6.4 \text{ г.}$$


Ответ: $m(CH_4) = 1.6 \text{ г}, m(CH_3OH) = 6.4 \text{ г.}$

5.7. Навеску смеси нитрата ртути(II) и нитрата железа(III) 17.84 г прокалили при температуре выше 400°C. Полученная газовая смесь была пропущена через раствор гидроксида лития. Объем прошедшего через раствор газа (непоглотившегося) составил 489 мл (при $T = 298 \text{ К}$, $p = 1 \text{ атм.}$). Рассчитайте массовые доли веществ в исходной навеске (*10 баллов*).

Решение. Разложение газовой смеси при прокаливании:



Поглощение газовой смеси раствором щелочи в присутствии кислорода:



Газ, прошедший через щелочь, – это избыток O_2 , его количество:

$$v(O_2)_{\text{ост}} = \frac{p \cdot V}{R \cdot T} = \frac{0.489}{0.082 \cdot 298} = 0.02 \text{ моль } O_2 \text{ не прореагировало.}$$

$$v(O_2)_{\text{ост}} = (0.75y + x) - 0.25(3y + 2x) = 0.5x,$$


$$x = 0.04 \text{ моль.}$$

$$\begin{aligned} v(Hg(NO_3)_2) &= 0.04 \text{ моль,} \\ m(Hg(NO_3)_2) &= 0.04 \cdot 325 = 13 \text{ г,} \\ \omega(Hg(NO_3)_2) &= 13 / 17.84 = 0.43 \text{ (или 43\%),} \\ \omega(Fe(NO_3)_3) &= 0.27 \text{ (или 27\%).} \end{aligned}$$

Ответ: $\omega(Hg(NO_3)_2) = 43\%, \omega(Fe(NO_3)_3) = 27\%.$

6.3. При сжигании газовой смеси этана и пропана выделилось 8.56 кДж тепла. Продукты сгорания были последовательно пропущены через хлоркальциевую трубку и 5 л дистиллированной воды, при этом масса хлоркальциевой трубы увеличилась на 279 мг. Рассчитайте pH водного раствора, если $K_d(H_2CO_3/HCO_3^-) = 4.27 \cdot 10^{-7}$, а теплоты сгорания этана и пропана равны 1561 кДж/моль и 2222 кДж/моль соответственно (*10 баллов*).

Решение. Реакции сгорания веществ:



Масса хлоркальциевой трубы увеличилась за счет поглощения паров воды, следовательно $m(H_2O) = 0.279 \text{ г}, v(H_2O) = 0.279 / 18 = 0.0155 \text{ моль. Составим и решим систему уравнений:}$

$$\begin{cases} 1561x + 2222y = 8.56 \\ 3x + 4y = 0.0155 \end{cases}$$

$$x = 0.0005 \text{ моль, } y = 0.0035 \text{ моль.}$$

Значит, в результате сгорания образовалось $v(CO_2) = 2x + 3y = 0.001 + 3 \cdot 0.0035 = 0.0115 \text{ моль. Углекислый газ поглощается водой: } CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3.$

$$c(H_2CO_3)_{\text{исх}} = v / V = 0.0115 / 5 = 0.0023 \text{ моль/л.}$$

В результате диссоциации угольной кислоты




$$K_{\text{дис}} = \frac{[H^+][HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = \frac{0.0023-z}{z} \approx \frac{z^2}{0.0023} = 4.27 \cdot 10^{-7}$$

$$[H^+] = \sqrt{0.0023 \cdot 4.27 \cdot 10^{-7}} = 3.134 \cdot 10^{-5} \text{ моль/л},$$

$$\text{pH} = -\lg[H^+] = 4.5.$$







Ответ: pH = 4.5.

7.8. Расшифруйте следующую схему превращений, напишите уравнения соответствующих реакций, укажите условия их протекания. Приведите структурные формулы соединений А-Д:




(12 баллов).


Решение. Один из возможных вариантов решения:








Другой вариант:



8.3. Напишите уравнения реакций приведенных ниже превращений и укажите условия их проведения (X – вещество, содержащее калий, Y – вещество, содержащее алюминий):





Решение.



Ответ: X – KOH, Y – Al(OH)₃.

9.6. В результате реакции карбоновой кислоты с бутанолом-1 получено 6.48 г сложного эфира с выходом 75%. При полной нейтрализации такого же количества этой кислоты водным раствором гидроксида бария образовалось 9.56 г соли. Установите формулу карбоновой кислоты. Что происходит с этой кислотой при нагревании до 150°C? Напишите уравнения протекающих реакций (14 баллов).

Решение. Карбоновая кислота может быть одноосновной или многоосновной. Обозначим основность кислоты через n . Реакции кислоты со спиртом и щелочью:



$$m(\text{эфира})_{\text{теор.}} = 6.48 \cdot 0.75 = 8.64 \text{ г.}$$

$$v(\text{кислоты}) = v(\text{соли}) = v(\text{эфира})$$


$$m(\text{соли}) / M(\text{соли}) = m(\text{эфира}) / M(\text{эфира}).$$

Пусть молярная масса радикала R равна x , тогда:

$$9.56 / (x + 112.5n) = 8.64 / (x + 101n),$$

$$x = 7n,$$

При $n = 1$ $x = 7$ (такого радикала нет), при $n = 2$ $x = 14$, это радикал $-\text{CH}_2-$, кислота – малоновая $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{COOH}$.



10.8. При взаимодействии двух простых веществ, одно из которых – чёрные кристаллы с фиолетовым отблеском (относительная плотность паров данного вещества по азоту равна 9.07), получаются красные кристаллы. Массовая доля более лёгкого элемента в полученном соединении равна 21.846%. Полученные красные кристаллы активно взаимодействуют с раствором гидроксида натрия. При электролизе полученного раствора с диафрагмой (продукты электролиза не взаимодействуют с раствором) на аноде выделяется 7.21 г веществ до начала выделения кислорода. Рассчитайте максимальный объём сернистого газа (н.у.), который может быть окислен полученным раствором.

Решение. Одно из реагирующих веществ определяем по его молярной массе:

$$M = D_{\text{N}_2} \cdot M(\text{N}_2) = 9.07 \cdot 28 = 254 \text{ г/моль}, \text{ это I}_2 \text{ (чёрные кристаллы с фиолетовым отблеском).}$$

Иод может реагировать с другим веществом (обозначим его через Z) либо в качестве восстановителя, либо в качестве окислителя. Если I_2 – восстановитель, то Z – окислитель, тогда




Логично предположить, что иод в полученном веществе IZ_n является более тяжелым элементом. Тогда по условию задачи


$$\omega(Z) = \frac{nM_Z}{nM_Z + 127} = 0.21846, \text{ отсюда } 0.78154nM_Z = 27.74442.$$

Если $n = 1$, то $M_Z = 35.5$ г/моль – искомый элемент Cl.



Тогда реакция взаимодействия двух простых веществ:



При взаимодействии со щелочью происходит реакция диспропорционирования Γ^- с образованием x моль NaI , $1.5x$ моль NaCl и $0.5x$ моль NaIO_3 .



При электролизе полученного раствора на аноде выделяется I_2 и Cl_2 за счет окисления иодид- и хлорид-ионов (иодат натрия электролизу не подвергается и остается в растворе и после окончания электролиза):



$$1.5x \text{ моль} \quad 0.75x$$


Масса продуктов, выделившихся на аноде:

$$m = m(I_2) + m(Cl_2) = 0.5x \cdot 254 + 0.75x \cdot 71 = 7.21,$$

отсюда $x = 0.04$ моль.

Сернистый газ будет окислен иодатом натрия. Количество иодата натрия составляет

$$v = 0.5x \text{ моль} = 0.5 \cdot 0.04 = 0.02 \text{ моль.}$$



$$0.02 \text{ моль}$$

Отсюда $v(SO_2) = 3 \cdot v(NaIO_3) = 0.06$ моль.

$$V(SO_2) = 0.06 \cdot 22.4 = 1.344 \text{ л.}$$

Ответ: 1.344 л.



2013/2014 учебный год
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ²

олимпиады школьников «ЛОМОНОСОВ»
по ХИМИИ для 10-11 классов

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

ПОБЕДИТЕЛЬ:

От 99 баллов включительно и выше.

ПРИЗЁР:

От 70 баллов до 98 баллов включительно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени):

От 89 баллов включительно и выше.

ПРИЗЁР (диплом II степени):

От 77 баллов до 88 баллов включительно.

ПРИЗЁР (диплом III степени):

От 66 баллов до 76 баллов включительно.

² Утверждены на заседании жюри олимпиады школьников «Ломоносов» по химии.