




60-я Всесибирская открытая олимпиада школьников

Заключительный этап 2021-2022 уч. года

Задания по химии

8 класс



Задание 1. «Гений, миллиардер, филантроп».

«– Когда ты успел стать экспертом в области ядерной физики?
– Вчера.»

Диалог Тони Старка и агента Хилл.

Тони Старк по праву считается одним из самых ярких персонажей вселенной Marvel. История о молодом бизнесмене, показанная на больших экранах в 2008 г., начиналась драматично: владельца крупнейшей компании по производству оружия «Stark Industries» серьезно ранили и захватили в плен в Афганистане. Всё могло бы закончиться трагично, если бы миллионер не обладал выдающимися интеллектуальными способностями. За короткий промежуток времени Старк собрал уникальный боевой костюм, который позволил ему одержать победу над захватчиками и сбежать.



Основой костюма «Mark I», собранного Старком в заключении, являлся металл **A**. Второй среди металлов по распространенности в земной коре **A** в промышленности получают из его оксидных минералов – гематита и магнетита. Наиболее распространенной технологией получения металла **A** является доменный процесс, в котором **A** образуется в результате восстановления гематита монооксидом углерода [реакция 1].


1. Установите металл **A**, если известно, что для получения 560 килограммов **A** (выход 80 %) из гематита необходимо использовать 420 м³ монооксида углерода (н. у.). Ответ подтвердите расчетом.

2. Установите формулу гематита и запишите уравнение реакции [1].

Первый бронированный костюм «Mark I» был оснащен боевым оружием и реактивными установками для полетов, а его масса составляла 41 килограмм.

3. Вычислите массу руды (содержание **A** 24%), добываемой в США, которую необходимо переработать для производства костюма «Mark I», если содержание **A** в костюме составляло 60%. Считайте, что **A** из руды можно получить с выходом 75%.

Успешное освобождение Тони Старка из плена было неслучайным: с раннего детства молодой человек много времени посвящал науке и технике. Средства массовой информации сообщали, что уже в 4 года Старк собрал свою первую плату. По всей видимости, именно в этот период он и познакомился с химией элемента, образующего металл **A**: в любительской радиотехнике травление печатных плат осуществляется с помощью соединения **B** [реакция 3].




4. Установите соединения **B** и **C** и напишите уравнения реакций [2-4].

После побега Тони Старк продолжил работу над костюмом уже в своей собственной мастерской и быстро выяснил, что сплавы на основе **A** не подходят для полетов из-за обледенения на большой высоте. Основой улучшенной версии костюма «Mark III» стал сплав металла **X** с золотом, который позволил Старку решить проблему обледенения и взлетать на большую высоту. Сплавы **X** в настоящее время активно используются в самолетостроении и ракетостроении, что обусловлено одновременной легкостью и инертностью **X**. В природе элемент **D**, образующий металл **X**, встречается в виде оксида **Y** с содержанием **D** 60%. В одном моле оксида **Y** содержится 38 моль протонов.

5. Установите элемент **D** и оксид **Y**. Ответ подтвердите расчетом.

Для получения металла **X** из его оксида используют двухступенчатую схему.



6. Установите соединение **Z** и напишите уравнения реакций [5-6].

При нагревании металла **X** в атмосфере азота [реакция 7] образуется соединение **W**, содержащее 22,58% азота по массе. Примечательно, что соединение **W** используется для создания декоративных покрытий. Поверхности, покрытые **W**, обладают высокой износостойкостью, а внешне напоминают золото.

7. Установите формулу соединения **W** и напишите уравнение реакции [7].

Износостойкость покрытий на основе **W** обусловлена низкой реакционной способностью данного соединения. Без нагревания **W** может взаимодействовать только со фтором [реакция 8], а для взаимодействия **W** с кислородом [реакция 9] температура реакционной смеси должна быть выше 700°C.

8. Напишите уравнения реакций [8]-[9].

Тони Старк никогда не отличался скромностью, поэтому уже в конце первого фильма объявил, что именно он является тем супергероем, которому средства массовой информации (СМИ) приписывали спасения поселений в Афганистане.

9. Как СМИ называли героя, которым оказался Тони Старк?

Задание 2. «Лабораторные практикумы ФЕН НГУ».

«Химии никоим образом научиться невозможно, не видав самой практики и не принимаясь за химические операции»

М.В. Ломоносов.

Все студенты-химики, обучающиеся на химическом отделении факультета естественных наук новосибирского государственного университета, очень много времени проводят в химических лабораториях. Помимо выполнения дипломной работы, которое занимает больше половины времени на 4-5 курсах, на 1-3 курсах студенты проходят практикумы по общей и неорганической, органической, аналитической химии, химической термодинамике и химической кинетике, а также по инструментальным методам анализа. Сегодня мы предлагаем Вашему анализу слегка вымыщенную историю о трудоемком, но чрезвычайно интересном пути студента-отличника ФЕН НГУ Сергея С. в процессе получения зачетов на лабораторных практикумах.

1 курс обучения. Практикум по неорганической химии.

Исследуя химические свойства соединений неметалла **X**, Сергей сначала посмотрел на отношение соответствующего простого вещества **A** к кислотам и щелочам. В три колбочки Сергей поместил немного твердого вещества **A**, добавил к нему концентрированные азотную кислоту, соляную кислоту и натриевую щелочь, а полученные смеси поставил кипятиться на плитку. Спустя некоторое время Сергей обнаружил, что порошок вещества **A** полностью растворился в азотной кислоте [реакция 1] и щелочи [2], а в колбе с соляной кислотой никаких изменений не произошло. Сергей осторожно добавил в колбу с NaOH несколько капель концентрированной соляной кислоты и поднес к горлышику колбы влажную бумагу, пропитанную раствором нитрата свинца, после чего бумага сразу почернела [3]. Взяв несколько капель раствора из колбы с азотной кислотой, он добавил их в пробирку с раствором хлорида бария, с удовлетворением отметив образование белого осадка [4].

1. Напишите формулу вещества **A** и символ элемента **X**, если известно, что 1 г **A** содержит $3 \cdot 10^{23}$ электронов. Если по имеющимся данным ответить на вопрос не получилось, то попробуйте воспользоваться данными о массовой доле водорода в газе **C**. Напишите уравнения реакций [1] – [4].

Продолжая изучать химические свойства соединений элемента **X**, Сергей провел множество реакций. Из баночки с веществом **B** Сергей отобрал немного черного порошка и добавил его в пробирку с концентрированной соляной кислотой [5], после чего быстро подносил к горлышику пробирки полоски фильтровальной бумаги, смоченные иодной водой [6] и подкисленным азотной кислотой раствором перманганата калия [7], отмечая происходящие при этом изменения. Затем Сергей заткнул пробирку пробкой с газоотводной трубкой и поджег выделяющийся газ **C** ($\omega(H) = 5,88\%$). Посмотрев, как горит этот газ, Сергей потушил пламя и поместил газоотводную трубку в пробирки с растворами нитратов серебра, меди(II) и марганца (II). В двух пробирках наблюдались изменения [8], [9], в третьей ничего не произошло.

2. Напишите формулы веществ **B**, **C** и уравнения реакций [5] – [9], если известно, что из 1 г **B** можно получить до 255 мл (н.у.) газа **C**. Какие визуальные изменения наблюдал Сергей при протекании реакций [6], [7]? Напишите уравнения реакции сгорания **C** в избытке [10] и недостатке [11] кислорода.

Наконец, Сергей приступил к изучению химических свойств кислоты **D** ($\omega(X) = 32,65\%$). Для этого он налил в 2 пробирки по 8 мл воды, добавил к ним по 2 мл концентрированного раствора **D** и хорошо перемешал. Взяв еще две пробирки, он также поместил в них по 2 мл концентрированного раствора **D**, а затем провел реакции разбавленной [12] и концентрированной [13], [14] кислоты с гранулами цинка [12], [13] и медной стружкой [14].

3. Напишите формулу кислоты **D** и уравнения реакций [12], [13], [14]. Какой элемент является окислителем в реакции [13]? Почему медь не реагирует с разбавленной кислотой **D**? Рассчитайте массовую долю кислоты **D** в указанном разбавленном растворе, если концентрированный раствор кислоты содержит 98,00 % **D** по массе и имеет плотность 1,836 г/мл.

По окончанию практикума по неорганической химии студенты выполняют и пишут курсовую работу. В качестве темы своей курсовой работы Сергей выбрал получение раствора вещества **E** в кислоте **D**.

Для получения вещества **E** Сергей решил воспользоваться хорошо известным способом – разложением соли **F** при 650°C, которое в свою очередь, обычно получают обезвоживанием при нагревании кристаллогидрата **G**. Сергей взял из банки большую навеску 97,22 г синей соли **G** ($\omega(X) = 12,8\%$) и растворил её в минимальном количестве воды при нагревании до 80°C. Горячий насыщенный раствор соли Сергей отфильтровал через складчатый фильтр для избавления от нерастворимых примесей, фильтрат собрал в стакан объёмом 100 мл и охладил до 0°C в кристаллизаторе со льдом. Выделившиеся синие кристаллы **G** Сергей отфильтровал на воронке Бюхнера, промыл ледяной водой и спиртом и хорошо высушил током воздуха с помощью водоструйного насоса. Собранные сухие кристаллы **G** Сергей поместил в фарфоровый тигель и нагрел до 300°C, получив белый порошок соли **F**.

4. Напишите формулы веществ **E**, **F**, **G**, если известно, что в ходе нагревания до 300°C **G** теряет 36 % своей массы. Рассчитайте объём воды, взятый Сергеем для приготовления насыщенного при 80°C раствора соли. Какую максимальную массу **F** может получить Сергей из исходно взятой навески **G**? Растворимость **G** (в расчете на безводную соль) при 80°C равна 55,0 г в 100 мл воды, а при 0°C растворимость (в расчете на безводную соль) падает до 14,1 г в 100 мл воды.

Получив в предыдущем опыте порошок вещества **F**, Сергей собрал специальную установку для получения **E**, в которой нагревал **F** до 650°C, при этом по прямому холодильнику вещество **E** ($T_{пл} = 17^{\circ}\text{C}$, $T_{кип} = 45^{\circ}\text{C}$) поступало в охлаждаемую кристаллизатором со льдом колбу-приёмник. Так как Сергей заранее взвесил колбу-приемник, то он смог определить массу полученного **E**, она оказалась равной 23,71 г. Сергей отобрал 4,880 г полученного **E** в стеклянную ампулу, после чего запаял её и оставил храниться в лаборатории до следующего года, а затем приступил к выполнению второй части курсовой работы.

5. Рассчитайте выход полученного продукта (**E**) по отношению к исходно взятой навеске соли **G**.

Задачей курсовой работы стояло измерение плотностей растворов **E** в **D**. Для этого Сергей отобрал 10,00 мл концентрированного раствора **D** из банки и добавлял к нему порции вещества **E**, каждый раз измеряя массу вновь добавленного вещества с помощью весов. Результаты измерений приведены в таблице:

№ измерения	0	1	2	3	4
$m_{\text{добав.}}(E)$, г*	0	1,632	2,221	2,777	3,570
ρ_{p-a} , г/мл	1,836	1,830	1,862	1,897	1,931
$\omega(E)_{\text{в р-ре}}$	0	?	?	?	?

*Каждая следующая порция **E** добавляется к уже добавленной ранее. Таким образом, раствор имеет плотность 1,931 г/мл после добавления 10,2 г **E** к 10,00 мл концентрированного раствора **D**.

6. Помогите Сергею оформить отчет о курсовой работе, вычислив массовую (в %) и молярную концентрацию вещества **E** в полученных растворах. Напишите тривиальное название раствора **E** в **D**. В ходе вычислений старайтесь не округлять промежуточные величины больше чем до 4 знаков после запятой.

2 курс обучения. Практикум по аналитической химии.

На втором курсе обучения Сергей довольно много узнал о количественных методах анализа, поэтому на курсовой работе по аналитической химии решил определить чистоту полученного на первом курсе вещества **E**. Для перевода **E** в более удобное для анализа вещество **D** Сергей поместил ампулу с 4,880 г **E** в холодную воду и разбил её. Полученный раствор кислоты **D** Сергей количественно перенёс в мерную колбу на 1000 мл. Для проведения анализа полученного раствора Сергею необходимо было приготовить раствор NaOH и стандартизовать его при помощи первичного стандарта – 0,0500 М раствора **D**. Для стандартизации раствора NaOH Сергей отобрал аликвоту 10,00 мл 0,0500 М раствора **D**, поместил ее в колбу для титрования, добавил несколько капель индикатора фенолфталеина и титровал раствором щелочи из бюретки до перехода окраски из бесцветной в малиновую. Средний объём раствора NaOH , затраченный на титрование, оказался равен 18,63 мл. Для анализа раствора **D**, полученного из навески **E**, Сергей отобрал из мерной колбы на 1000 мл аликвоту 10,00 мл и титровал раствором NaOH до перехода окраски индикатора в колбе для титрования. Средний объём раствора NaOH , затраченный на титрование, оказался равен 22,62 мл.

7. Рассчитайте молярную концентрацию NaOH в приготовленном растворе. Рассчитайте массовую долю **E** в используемой навеске. Что является основной примесью в указанной навеске и откуда она может взяться?

3 курс обучения. Практикум по химической термодинамике.

Во время выполнения работы по измерению тепловых эффектов Сергей вспомнил былые годы и решил провести калориметрические измерения теплового эффекта процесса смешения жидкого вещества **D** с дистиллированной водой. Такой тепловой эффект называют тепловым эффектом разбавления **D**. Для измерений Сергей помещал 1,00 мл чистой воды в терmostатированный при 25°C сосуд и при перемешивании

добавлял к ней известные порции жидкой **D**. Сергей измерил количество тепла, выделившегося в процессе смешения, а полученные результаты свел в таблицу:

№ опыта	1	2	3
$m_{\text{добавл}}(\mathbf{D}), \text{г}$	11,50	15,67	24,00
$Q, \text{Дж}$	1741	1744	1751

8. Исходя из полученных данных, оцените объём 98,00 % раствора **D**, который нужно добавить к 1 мл воды для доведения полученного раствора до кипения ($T_{\text{кип}}$ примите равной 100°C, начальная температура раствора равна 20°C). Теплоемкость всех растворов считайте равной теплоемкости воды (4,18 Дж/г·К).

Задание 3. «Обычные дрова».

«There are three things you can watch forever: fire, water, and other people working». Пословица.

В современном мире природное топливо начинает все активнее вытесняться искусственным. На смену древесине, нефти и природному газу приходят такие виды топлива, как разнообразные брикеты для печей и котлов, бензин, генераторный газ и т.п. Тем не менее, старое доброе берёзовое полено по-прежнему остаётся ценным отопительным ресурсом не только в традиционных деревнях и сёлах, но и на вполне современных дачах и в коттеджах, где все более широкое распространение находят дровяные камины и русские бани. Да и умение развести костер в походных условиях требует специальных знаний о разновидностях дров и особенностях их горения.

1. Какие из перечисленных видов топлива являются природными, а какие – искусственными: торф, мазут, водород, биодизель, сланцы, ^{238}U , ^{239}Pu , антрацит? Переведите на русский язык эпиграф к этой задаче, который россияне считают английской пословицей, а англичане – русской.

Обычная древесина состоит преимущественно из органических полимеров: целлюлозы с простейшей формулой $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$ (около 74% по массе в расчёте на сухую древесину) и лигнина, имеющего переменный состав (его приблизительная формула $\text{C}_{31}\text{H}_{34}\text{O}_{11}$). Содержание лигнина в сухой древесине составляет примерно 25% по массе. Для простоты будем считать, что оставшаяся масса представлена в основном неорганическими веществами, практически не содержащими углерода, водорода и кислорода.

2. При анализе некоторого образца сухой древесины было установлено, что массовое содержание углерода в ней составляет 49,00%, а кислорода 44,00%. Вычислите точные массовые доли целлюлозы, лигнина и суммарную массовую долю неорганических компонентов в данном образце. (Атомные массы элементов округлять до целых).

Одной из важнейших характеристик древесины является содержание влаги, выражющееся в единицах относительной влажности. Относительная влажность определяется как отношение массы воды, содержащейся в образце, к массе сухой древесины, выраженное в процентах. Данная величина может достигать даже 200%, если древесина долго находилась в воде.

3. Некоторый образец влажной древесины после сушки при 100°C в течение 10 час потерял 20% своей массы. Вычислите относительную влажность данного образца (древесину после такой сушки можно считать сухой).

Нас, разумеется, интересует теплотворная способность древесины. В таблице представлены характеристики двух образцов древесины с различным массовым содержанием целлюлозы и лигнина.

№	Относительная влажность, %	Содержание целлюлозы, %	Содержание лигнина, %	Теплота сгорания сырой древесины, МДж/кг	Теплота сгорания сухой древесины, МДж/кг
I	40,00	74,50	24,00	11,97	17,74
II	?	72,00	26,50	14,00	17,90

Теплота сгорания древесины (Q) – количество теплоты, выделившееся при сгорании 1 кг древесины. Термогравиметрический метод определения теплоты сгорания древесины основан на измерении количества теплоты, выделившейся при сгорании определенного количества древесины в специальном приборе.

Удельная теплота сгорания (q) – количество теплоты выделившееся при сгорании 1 кг конкретного вещества.

4. Запишите уравнения реакций полного сгорания целлюлозы и лигнина.

5. Используя данные о теплотах сгорания сухих образцов древесины, вычислите удельные теплоты сгорания чистой целлюлозы ($q_{\text{ц}}$, МДж/кг) и чистого лигнина ($q_{\text{л}}$, МДж/кг). Считайте, что неорганические примеси не влияют на теплоту сгорания древесины, а в реакциях образуется газообразная вода.

В случае сгорания сырой древесины выделяется меньшее количество тепла, поскольку часть тепла, образующегося в ходе реакции, идет на испарение влаги. Кроме того, на единицу массы сырых дров приходится меньшее количество горючего вещества.

6. Используя данные о теплоте сгорания сырой древесины и влажности для образца I, вычислите удельную теплоту испарения воды (L , МДж/кг) и влажность образца II.

7. Какую массу сухих дров можно получить из 1 т сырых дров, аналогичных по составу образцу I, если теплоту, необходимую для сушки древесины, получать сжиганием части исходных сырых дров?