

**Олимпиада школьников
«Покори Воробьевы горы»
по математике**

Задания заочного этапа 2020/2021 учебного года для 5–6 класса

1) Остров Рыцарей и Лжецов. Рыцари всегда говорят правду, лжецы - всегда лгут. Однажды путешественник пришел на перекресток и спросил, где находится город Рыцарей у 4 аборигенов - А, Б, В и Г.

А ответил - Идите на север, там город Рыцарей

Б ответил - Нет, город Рыцарей на юге

В сказал - не верьте, А и Б - лжецы

Г возразил - А, Б и В - рыцари.

Сколько рыцарей среди них на самом деле?

Решение: А и Б противоречат друг другу, поэтому Г - точно лжец. Если В - рыцарь, то А и Б - лжецы. А если В - лжец - то кто-то из А и Б рыцарь, а другой лжец. В любом случае среди них ровно 1 рыцарь. **Ответ: 1.**

2) На заводе работают токари и фрезеровщики, токарей 60%. В январе уволили некоторое количество токарей и их стало 20%. А в феврале уволили часть фрезеровщиков, после чего токарей снова стало 60%. Какой процент работников завода был уволен за январь-февраль? Ответ округлите до ближайшего целого числа.

Решение: В январе количество фрезеровщиков не менялось. До увольнения их было 40%, после стало 80%, следовательно, уволили половину рабочих. Аналогично, в феврале не менялось число токарей. Их было 20% до увольнения и стало 60% после - следовательно, уволили $\frac{2}{3}$ рабочих. таким образом, осталось $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ всех рабочих, т.е. $16\frac{2}{3}\%$. Т.е. всего было уволено $83\frac{1}{3}\%$ рабочих.

Ответ: 83.

3) Представьте $\frac{4}{2021}$ в виде разности двух дробей с числителями, равными 1. В ответе укажите сумму знаменателей.

Решение: $2021 = 2025 - 4 = 45^2 - 2^2 = 43 \cdot 47$. Поэтому $\frac{1}{43} - \frac{1}{47} = \frac{4}{2021}$. **Ответ 90.**

4) В выражении $0 * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9$ вместо «звездочек» можно ставить знаки «+» или «-». Сколько различных положительных чисел можно получить таким образом?

Решение: Если везде поставить знак «+», то получится 45. В выражение входят 5 четных и 5 нечетных чисел, поэтому результат всегда будет нечетным. Докажем, что можно получить любое нечетное. Предположим, что $2k + 1$ получить можно, а $2k - 1$ - нельзя. Рассмотрим выражение, равное $2k + 1$. Если 1 входит со знаком «+», то поменяем на «-» и получим на 2 меньше. Если 1

входит со знаком «-», а 2 - со знаком «+» - поменяем знаки у обоих, и т.д. Все числа не могут входить со знаком «-», т.к. результат будет отрицательный.

В итоге получим все 23 нечетных числа от 1 до 45. **Ответ: 23**

5) Петя пошел в лес по грибы и, конечно же, взял с собой smart-часы со встроенным компасом, шагомером и транспортиром. Петя заметил, что, когда он входил в лес между 8 и 9 часами утра, угол между часовой и минутной стрелкой составил ровно 72° . А когда он выходил из леса между 13 и 14 часами, угол тоже был ровно 72° . Сколько минут Петя провел в лесу, если известно, что это число минут - целое?

Решение: Пусть Петя зашел в лес в 8ч. x мин. Угол поворота часовой стрелки (относительно отметки 12) составит $240 + \frac{x}{2}$, а угол поворота минутной - $6x$. Составим уравнение $|240 + \frac{x}{2} - 6x| = 72$. Его решения $x = 30\frac{6}{11}$ и $x = 56\frac{8}{11}$. Аналогично для момента выхода 13ч. y мин. составим уравнение $|30 + \frac{y}{2} - 6y| = 72$ и решим его: $y = 18\frac{6}{11}$ (второй корень отрицательный). Чтобы количество минут, проведенных в лесу, было целым, выбираем $x = 30\frac{6}{11}$. **Ответ: 288**

6) На окружности отмечена точка А. Построили правильный 3-угольник, 4-угольник, ..., 10-угольник, вписанные в эту окружность и имеющие точку А одной из вершин. Все вершины этих многоугольников покрасили в красный цвет. Найдите, сколько получилось различных красных точек на окружности?

Решение: Поставим каждой точке X на окружности в соответствие число из интервала $[0,1)$ следующим образом: Возьмем расстояние, которое надо пройти по окружности из точки А против часовой стрелки, чтобы попасть в X и поделим его на длину окружности. Например, вершинам правильного треугольника будут соответствовать числа $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$. Для удобства добавим «1-угольник» - точку А (ей соответствует 0) и «2-угольник» - точку А и диаметрально противоположную ей (ей соответствует $\frac{1}{2}$)

Заметим, что если последовательно строить 1-, 2-, 3-, ..., 10- угольники, то, новые точки, появляющиеся при построении n -угольника, соответствуют несократимым дробям вида $\frac{k}{n}$.

Количество таких дробей (кроме $n=1$) равно количеству натуральных чисел, меньших n и взаимно простых с n . В математике это число носит название *функция Эйлера* и обозначается $\varphi(n)$.

В итоге получим $1 + \varphi(2) + \varphi(3) + \dots + \varphi(10) = 1 + 1 + 2 + 2 + 4 + 2 + 6 + 4 + 6 + 4 = 32$.

Ответ: 32.

7) Какое наименьшее значение может принимать сумма $x + y + z$ при условиях:

$$\begin{cases} x + 2y \geq 5 \\ y + 3z \geq 6 \\ x, y, z \geq 0 \end{cases}?$$

Ответ округлите до сотых по стандартным математическим правилам.

Решение: Из первого неравенства $x \geq 5 - 2y$, поэтому всегда можно поставить $x = \max(5 - 2y, 0)$ при этом $x + y + z$ не возрастет. Аналогично, из второго неравенства $z \geq 2 - \frac{y}{3}$, поэтому можно заменить z на $\max\left(2 - \frac{y}{3}, 0\right)$. Рассмотрим функцию $f(y) = \max(5 - 2y, 0) + y + \max\left(2 - \frac{y}{3}, 0\right)$.

Она принимает наименьшее значение, равное $\frac{11}{3}$, при $y = \frac{5}{2}$. **Ответ: 3.67.**