



**Межрегиональная олимпиада школьников
«Высшая проба»**

2013-2014 учебный год

**ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА по
МАТЕМАТИКЕ**

Время выполнения задания: 240 минут.

Информация для участников: максимальная оценка за каждую задачу — 20 баллов, независимо от сложности задачи. Максимальная оценка за всю работу — 100 баллов. Если сумма баллов, набранных участником по всем задачам, превосходит 100, его итоговая оценка равна 100.

1. На координатной плоскости нарисовано множество точек, заданное уравнением $x = y^2$. Окружность радиуса 5 с центром в точке $(11; 1)$ пересекает это множество в точках A, B, C и D . Докажите, что все точки A, B, C, D лежат на одной параболы, т.е. на кривой, задаваемой уравнением $y = ax^2 + bx + c$, и найдите уравнение этой параболы.
2. Через вершины правильного шестиугольника проведены 6 различных параллельных прямых. Может ли оказаться так, что все попарные расстояния между этими прямыми являются целыми числами?
3. Последовательность a_n строится следующим образом: a_1, a_2 — произвольные действительные числа, при $n \geq 3$ число a_n равно наименьшему из чисел $|a_i - a_j|$, $1 \leq i < j \leq n - 1$. Например, если $a_1 = 6$, $a_2 = \frac{19}{2}$, то получаем последовательность $6, \frac{19}{2}, \frac{7}{2}, \frac{5}{2}, 1, 1, 0, 0, 0, \dots$. При некотором выборе a_1, a_2 получилась последовательность, в которой $a_{10} = 1$. Найдите наименьшее возможное значение a_3 в такой последовательности.
4. Многогранник вписан в сферу радиуса R , а его объем численно равен площади его поверхности.
 - а. Докажите, что $R > 3$.
 - б. Может ли R быть больше 1000?
5. Пусть $p > 2$ — целое число, не делящееся на 3. Докажите, что существуют такие целые числа a_1, a_2, \dots, a_k , что

$$-\frac{p}{2} < a_1 < a_2 < \dots < a_k < \frac{p}{2},$$

и произведение

$$\frac{p - a_1}{|a_1|} \cdot \frac{p - a_2}{|a_2|} \cdot \dots \cdot \frac{p - a_k}{|a_k|}$$

равно 3^m для некоторого натурального m .

6. На клетчатой доске размером $2 \times n$ клеток некоторые клетки закрашиваются в чёрный цвет. Раскраска называется правильной, если среди закрашенных нет двух соседних клеток. (Соседними называются клетки, имеющие общую сторону.) Раскраска, в которой ни одна клетка не закрашена, тоже считается правильной. Пусть A_n — количество правильных раскрасок с чётным числом закрашенных клеток, B_n — количество правильных раскрасок с нечётным числом закрашенных клеток. Найти все возможные значения $A_n - B_n$.



Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»

2013-2014 учебный год

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА по МАТЕМАТИКЕ

Класс	ПОБЕДИТЕЛИ	ПРИЗЕРЫ	
	Дипломанты 1 степени	Дипломанты 2 степени	Дипломанты 3 степени
	Критерии определения	Критерии определения	Критерии определения
7	от 95 и выше	от 80 до 94	от 60 до 79
8	от 85 и выше	от 70 до 84	от 60 до 69
9	от 95 и выше	от 75 до 94	от 60 до 74
10	от 80 и выше	от 60 до 79	от 50 до 59
11	от 80 и выше	от 60 до 79	от 45 до 59