



Заключительный этап. Математика

Комплекс предметов

Категория участников: школьники 7-11 классов

Задания заключительного этапа XV Всероссийской Интернет-Олимпиады "Нанотехнологии - прорыв в будущее!" по математике.

Задачи 1-5 – простые, задачи 6-8 – сложные.

Задания

1. Нанонить

2. Тетраэдрические матрешки

ВНИМАНИЕ! В ЗАДАЧЕ 2 ВОПРОС ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Найдите n , x , y , если известно, что $x + y = 3n - 1$, $x - y = 11$

3. Мозаика вирусного капсида

4. Адсорбент

5. Два наносвертка

6. Шестиугольный фуллерен

7. Губка Менгера

8. Биметаллический кубookтаэдр. Часть 2

ВСЕ ЗАДАЧИ СОБРАНЫ В ОДНОМ ФАЙЛЕ (дополнительные материалы даны в конце файла, калькулятором пользоваться запрещено):



Математика для школьников 7 – 11 класса (заключительный этап)
Вариант IV

Задача 1. Нанонить (8 баллов)


Вольфрамовую проволоку диаметром $d_1 = 4,6$ мкм вытягивают в нанонить толщиной $d_2 = 100$ нм.

Во сколько раз при этом увеличивается:

- а) ее длина? (4 балла)
- б) площадь ее поверхности? (4 балла)

Считать, что плотность материала при его вытягивании неизменна.

Задача 2. Тетраэдрические матрешки (8 баллов)




Рассмотрим фуллерены (углеродные каркасные молекулы) в форме тетраэдра, в которых пара целых неотрицательных чисел n и m ($n \geq m$) задает число атомов по формуле

$$N = 4(n^2 + nm + m^2) - 8.$$

Для некоторой фуллереновой матрешки, представляющей собой два вложенных друг в друга тетраэдрических фуллерена (n, n) и $(n + 1, n + 1)$, существует имеющий такое же число атомов тетраэдрический фуллерен (x, y) .

Найдите n, x, y , если известно, что $x + y = 3n - 1$, $x - y = 11$.


Задача 3. Мозаика вирусного капсида (8 баллов)



Оболочка многих вирусов (капсид) представляет собой замкнутую мозаику, которая складывается из одинаковых белковых *элементов*. Элементы в структуре мозаики, в свою очередь, объединены в *группы* по 5, 6 и 7 штук так, что в любом узле мозаики эти группы сходятся по 3 (см. рисунок).

Капсид некоторого гигантского вируса содержит 1997 и 6 групп по 6 и 7 элементов, соответственно. Воспользовавшись теоремой Эйлера для выпуклых многогранников, рассчитайте общее число элементов **N** и общее число групп элементов **G** в таком капсиде.



Задача 4. Адсорбент (8 баллов)



В лаборатории получены наночастицы некоторого Адсорбента в форме куба, октаэдра и правильной удлиненной квадратной бипирамиды, см. рисунок.

Рассчитайте длину ребра **A** (в нм) для каждого из видов наночастиц, если известно, что отношение площади поверхности к объему S/V у них одинаково и равно $1,2 \text{ нм}^{-1}$.

Задача 5. Два наносвертка (8 баллов)



Прямоугольный лист двумерного наноматериала – дисульфида вольфрама – в некоторых условиях может сворачиваться без зазоров в наносвертки двух типов (рис. 1):

- I тип – продольный (сворачивается вдоль длинного края, $b > a$),
- II тип – диагональный (сворачивается вдоль диагонали прямоугольника).

Поперечное сечение этих наносвертков представляет собой спираль с шагом витка, равным толщине листа дисульфида вольфрама, $c = 0,775$ нм (рис. 2).

Оцените длину a (в нм) наносвертка I типа, если длина исходного листа равна $b = 500$ нм, а максимальный диаметр наносвертка II типа составляет $d_2 = 25$ нм.

Задача 6. Шестиугольный фуллерен (20 баллов)

Рассмотрим 4 типа фуллеренов (углеродных каркасных молекул, состоящих из пяти- и шестиугольников), форма которых подобна шестиугольной призме либо шестиугольной антипризме (рис. 1). Каждый тип однозначно определяется двумя парами индексов (n, m) ¹, задающими длину ребра основания и длину бокового ребра, соответственно.




Рис. 1. Примеры «выкроек» четырех типов шестиугольных фуллеренов на листе графена. На а) показаны единичные вектора r_1 и r_2 , задающие косоугольную систему координат¹.

1. Для каждого из 4 типов фуллеренов выведите в общем виде зависимость общего числа атомов углерода N от n . **(6 баллов)**
2. Для каждого из фуллеренов, представленных на рис. 1:
 - а) определите значение параметра n ; **(2 балла)**
 - б) рассчитайте число атомов N . **(2 балла)**
3. Могут ли фуллерены разных типов иметь одинаковое число атомов? Рассмотрите все возможные комбинации, ответ подтвердите расчетами. **(3 балла)**
4. Для фуллеренов, имеющих форму шестиугольной призмы, выведите формулы зависимости размера (как диаметра D описанной вокруг призмы сферы) от n и длины C–C связи a . **(5 баллов)** Найдите размеры таких фуллеренов, изображенных на рис. 1б и 1г, если $a = 0,14$ нм. **(2 балла)**

¹Любую пару шестиугольников на графеновом листе можно задать парой неотрицательных чисел (n, m) , являющихся координатами центра одного из них относительно центра другого в косоугольной системе координат (см. рис. 1а): $\vec{R} = n\vec{r}_1 + m\vec{r}_2$.

Задача 7. Губка Менгера (20 баллов)




Рис. 1. Поколения губки Менгера.

Если взять 20 одинаковых наночастиц в виде куба (рис. 1а, $i = 0$), то из них можно сложить «полый куб» – первое поколение губки Менгера (рис. 1б, $i = 1$). Из 20 таких губок с $i = 1$ аналогичным образом получается второе поколение (рис. 1в, $i = 2$), и так далее. Такие самоповторяющиеся структуры носят название фрактальных и достаточно часто встречаются в природе.

Рассмотрим губку Менгера i -го поколения, полученную из исходного куба с ребром a .

1. Найдите:
 - а) длину ребра A_i итогового нанокластера; **(1 балл)**
 - б) объемную долю пустот ω_i в таком нанокластере; **(4 балла)**
 - в) минимальное значение i_{\min} , для которого $\omega_i \geq 0,9$. **(3 балла)**




Рис. 2. Фрактальная структура грани губки Менгера.

2. Выведите формулу площади отдельной грани нанокластера $S_{гр}$ (рис. 2) i -го поколения. **(2 балла)**
3. Выведите формулы для расчета площади всей (и внутренней, и внешней) поверхности такого нанокластера S_i для губки Менгера:
 - а) 1-го, 2-го, 3-го поколения; **(3 балла)**
 - б) i -го поколения. **(4 баллов)** Ответ предоставьте в наиболее компактном виде.

Вклад поверхности в свойства материалов, обладающих каталитической активностью, прямо пропорционален характеристике $\Upsilon_i = S_i/V_i \cdot a$.

4. Рассчитайте величину Υ_i для губки Менгера i -го поколения. **(1,5 балла)**
5. Увеличивается или уменьшается Υ_i с ростом i ? Чему равно предельное значение этой величины? **(1,5 балла)**

Задача 8. Биметаллический кубоктаэдр. Часть 2 (20 баллов)

Для повышения каталитической активности кубоктаэдрического нанокластера, состоящего из атомов металла **A**, часть атомов заменили на атомы **B** таким образом, что:

- атомы **B** присутствуют только в слоях, на ребро которых приходится $n = 2k$ атомов (где k – натуральное число);
- взаимное расположение атомов **A** и **B** на гранях нанокластера показано на рис. 1–3 (атомы **B** отмечены более темным цветом).




Рис. 1. Взаимное расположение атомов **A** и **B** на треугольных гранях нанокластера A_xB_y .




Рис. 2. Взаимное расположение атомов **A** и **B** на квадратных гранях нанокластера A_xB_y .





Рис. 3. а) Двумерная развертка поверхностного слоя биметаллического нанокластера A_xB_y в форме кубоктаэдра. Пример для $n = 4$. б) Кубоктаэдр.

1. Сколько атомов **B** находится в поверхностном слое кубоктаэдрического биметаллического нанокластера A_xB_y , на ребро которого приходится:
 - а) 4 атома? **(2 балла)**
 - б) $n = 2k$ атомов? **(4 балла)**
2. Рассчитайте долю атомов **B** на поверхности нанокластера A_xB_y , на ребро которого приходится:
 - а) 4 атома; **(1 балл)**
 - б) $n = 2k$ атомов; **(2 балла)**
 - в) бесконечно большое число атомов. **(2 балла)**

3. Чему равно отношение $x:y$ в нанокластере A_xB_y , на ребро которого приходится:

- а) 4 атома? **(2 балла)**
- б) $n = 2k$ атомов? **(2 балла)**
- в) $n = 2k + 1$ атомов? **(2 балла)**
- г) бесконечно большое число атомов? **(3 балла)**

Общее число атомов в нанокластере в форме кубооктаэдра составляет

$$N = (10n^3 - 15n^2 + 11n - 3)/3.$$

Общее число атомов в поверхностном слое нанокластера в форме кубооктаэдра составляет

$$M = 10n^2 - 20n + 12 \text{ (для } n \geq 2\text{)}.$$

Дополнительные материалы

Теорема Эйлера для выпуклого многогранника:

$$V - E + F = 2,$$

где V , E , F – это, соответственно, число вершин, ребер и граней многогранника.

При расчетах π считать равным 3,1.

$$\sqrt{2} \approx 1,4, \sqrt{3} \approx 1,7, \sqrt{5} \approx 2,2, \sqrt{7} \approx 2,7, \sqrt{11} \approx 3,3, \sqrt{13} \approx 3,6, \sqrt{17} \approx 4,1, \sqrt{19} \approx 4,4.$$

$$\lg 2 = 0,30, \lg 3 = 0,48, \lg 5 = 0,70, \lg 7 = 0,85.$$

Сумма квадратов последовательности натуральных чисел 1, 2, ..., n :

$$\sum_{m=1}^n m^2 = n(n+1)(2n+1)/6.$$