
7 класс

1. (30 баллов) Два туриста одновременно выходят из одного пункта и через 6 S, км часов приходят в другой, расположенный в 24 км. Туристы не могли двигаться быстрее 7 км/час и им разрешалось изменить свою скорость только один раз - через 3 часа после начала движения. Зависимость разности S пройденных туристами путей от времени t приведена на рисунке. Какие наименьшие значения скорости мог иметь идущий впереди турист в первые 3 часа (10 баллов)



и вторые 3 часа (10 баллов) движения? Какой путь прошел за первые 3 часа идущий позади турист, если у идущего впереди скорость была наименьшей на второй половине времени движения (10 баллов)?

- 2. (30 баллов) Из двух сплавов с плотностями 5000 кг/м³ и 10000 кг/м³ сделали два шара радиусом 3 см каждый. У одного шара внутренняя часть радиусом 2 см сделана из легкого сплава, а внешняя часть (слой толщиной в 1 см) из тяжелого. У другого шара внутренняя часть сделана из тяжелого сплава, а внешняя из легкого. Во сколько раз отличаются массы шаров?
- **3**. (40 баллов) Подвешенная к потолку за один конец пружина растягивается под действием собственного веса на 1 см. На сколько изменится растяжение пружины, если к ней подвесить груз, масса которого вдвое больше массы пружины?