

Заключительный этап межрегиональной межвузовской олимпиады школьников

Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» 2015-2016 г.

Решения олимпиадных заданий по химии

10 класс

Часть 1. Разминка (общая оценка 20 баллов).

Решение.

- 1.1.** Для водородных соединений элементов VIA группы $\text{H}_2\text{Э}$ с увеличением порядкового номера кислотные свойства **возрастают**, а восстановительные свойства **тоже возрастают**.
- 1.2.** При взаимодействии карбида алюминия с водой образуется продукт, относящийся к классу **алканов**, а при взаимодействии карбида кальция с водой – к классу **алкинов**.
- 1.3.** В атоме алюминия в основном состоянии количество неспаренных электронов равно **1**, а в ионе Al^{3+} – **0**.
- 1.4.** В газофазной реакции $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2 + \text{Q}$ установилось химическое равновесие. Если увеличить температуру, то равновесие сместится **влево**, а если внести катализатор – **равновесие сохранится**.
- 1.5.** Фосфористая кислота H_3PO_3 имеет основность, равную **2**, а фосфорноватистая кислота H_3PO_2 – **1**.
- 1.6.** Среда водного раствора CuCl_2 **кислая**, а водного раствора $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ – **тоже кислая**.
- 1.7.** В соединении $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ степень окисления хрома **+6**, а в соединении $\text{K}_3[\text{Cr}(\text{OH})_6]$ **+3**.
- 1.8.** Агрегатное состояние I_2 при комнатной температуре и атмосферном давлении **твердое**, а его кристаллическая решетка в твердом состоянии **молекулярная**.
- 1.9.** Органический продукт, образующийся при взаимодействии алkenов с перманганатом калия в щелочной среде относится к классу **двухатомных спиртов (гликолей, диолов)**, а происходящий процесс называется реакцией **Вагнера**.
- 1.10.** При термическом разложении хлорида аммония образуются **аммиак (NH_3)** и **хлороводород (HCl)**.

Система оценивания:

Каждый правильный ответ по 1 б

всего $1 * 2 * 10 = 20$ баллов.

Итого 20 баллов

Часть 2. Качественные задания (общая оценка 40 баллов).

- 2.1.** Имеется семь водных растворов, содержащих следующие соединения в одинаковой молярной концентрации: уксусная кислота, формиат натрия, муравьиная кислота, ацетат натрия, хлороводород, хлорид натрия, серная кислота. Известно, что муравьиная кислота сильнее уксусной кислоты.

Расположите эти растворы в ряд в порядке возрастания значений pH. Ответ поясните.

Решение.

Самые высокие концентрации H^+ и, как следствие, самые маленькие значения pH (поскольку это **отрицательный** десятичный логарифм $[\text{H}^+]$) будут в растворах сильных кислот HCl и H_2SO_4 . Поскольку серная кислота при диссоциации дает два протона, а соляная один, самый низкий pH будет в растворе H_2SO_4 . Кислая среда будет еще в двух растворах слабых кислот – муравьиной и уксусной. Поскольку муравьиная кислота сильнее уксусной кислоты, в ее растворе pH будет меньше. В растворе NaCl – соли сильной кислоты и сильного основания – среда будет нейтральная, а в растворах солей сильного основания и слабых кислот CH_3COONa и HCOONa среда будет слабощелочной.

(за счет гидролиза по аниону). Поскольку муравьиная кислота сильнее уксусной, то ее соль будет подвержена гидролизу в меньшей степени, и pH в растворе формиата натрия будет меньше, чем в растворе ацетата натрия. Получаем следующий порядок возрастания значений pH:



Система оценивания:

Правильное положение каждого раствора в ряду по 1 б, верное пояснение места каждого раствора в ряду по 1 б (если перепутано направление ряда, то снимается 4 б; если сумма получается < 0, то выставляется 0)

$$1^*7+1^*7 = 14 \text{ баллов.}$$

Итого 14 баллов



2.2. Произойдет ли химическое взаимодействие с растворителем при раздельном помещении твердых веществ $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, Na_2SO_3 , Ag , ZnS , Al , FeSO_4 :

- а) в хлороводородную кислоту; б) в водный раствор гидроксида натрия;
- в) в концентрированную азотную кислоту?



Ответы подтвердите уравнениями реакций. Если вещество не взаимодействует с растворителем, то обязательно укажите это.

Решение.


а) Не взаимодействуют с HCl: $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, Ag , FeSO_4 .



б) Не взаимодействуют с NaOH: Na_2SO_3 , Ag , ZnS .



в) Не взаимодействуют с HNO_3 (конц.): $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, Al .



Система оценивания:


За верное указание об отсутствии взаимодействия по 0,5 балла,

за уравнения реакций по 1 баллу

$$0,5^*8+1^*10 = 14 \text{ баллов.}$$

Итого 14 баллов

2.3. Расшифруйте схему превращений (изобразите структурные формулы и напишите названия органических соединений **A – E**).



Назовите механизмы реакций превращения **B** в **C** и **C** в **D**

Решение.

A	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{Br}$	1-бромпропан
B	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{OH}$	пропанол-1

C		изопропилбензол, кумол, 1-метилэтилбензол, 2-фенилпропан
D		2-бром-2-фенилпропан
E		2-фенилпропен

B → C – электрофильное замещение

C → D – свободно-радикальное замещение

Система оценивания:

*Структурные формулы соединений А-Е по 1 баллу,
названия по 1 баллу*

*1*5+1*5 = 10 баллов;*

Названия механизмов по 1 баллу

*1*2 = 2 балла.*

Итого 12 баллов.

Часть 3. Расчетные задачи (общая оценка 40 баллов).


3.1. К раствору, содержащему 7,74 г смеси сульфата калия и сульфата натрия, добавили 152,4 мл 10 % -ного раствора хлорида бария (концентрация раствора 10 масс. %, плотность 1,092 г/мл). Выпавший осадок отфильтровали. К фильтрату (профильтрованному раствору) добавили 16 мл серной кислоты с концентрацией 2 моль/л, получив еще одну порцию такого же осадка, масса которого составила 6,99 г. Определите массовые доли солей в исходной смеси и массу оксида серы(VI), необходимую для приготовления израсходованной серной кислоты.

Решение.

а) Выпавший осадок – сульфат бария, по условию задачи его отделяют фильтрованием:
 $K_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4 \downarrow + 2KCl$; $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4 \downarrow + 2NaCl$.

В фильтрате могут присутствовать: непрореагировавшие сульфат калия и сульфат натрия (если хлорид бария в недостатке), хлорид бария (если он взят в избытке) и образовавшиеся хлорид калия и хлорид натрия.

В реакции с серной кислотой получился такой же осадок:



(3 балла: по 1 баллу за каждое уравнение реакции).

б) Определим массу оксида серы(VI), необходимую для приготовления раствора серной кислоты: $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$, то есть из 1 моль оксида получается 1 моль кислоты. Количество H_2SO_4 равно $0,016 * 2 = 0,032$ моль, следовательно, количество оксида серы(VI) равно 0,032 моль. Масса оксида серы (VI) составит $0,032 * 80 = 2,56$ г.

(3 балла. 1 балл за уравнение реакции + 2 балла за определение массы оксида).

в) Количество BaCl_2 , содержавшегося в исходном растворе:

$$n(\text{BaCl}_2) = 0,1 * 152,4 * 1,092 / 208 = 0,08 \text{ моль.}$$

(2 балла).

В реакции с серной кислотой получился осадок сульфата бария, следовательно, хлорид бария был взят в избытке, а сульфаты при первом слиянии прореагировали полностью.

(2 балла за установление избытка хлорида бария)

Количество сульфата бария получившегося в результате реакции с серной кислотой:

$$n(\text{BaSO}_4) = 6,99 / 233 = 0,03 \text{ моль.}$$

Количество H_2SO_4 посчитано в п. б и равно 0,032 моль, следовательно, серная кислота взята в избытке по отношению к оставшемуся в растворе хлориду бария.

$$\text{Тогда } n(\text{BaCl}_2 \text{ (ост)}) = n(\text{BaSO}_4) = 6,99 / 233 = 0,03 \text{ моль.}$$

Следовательно, 0,03 моль хлорида бария осталось в фильтрате, а в реакцию с сульфатами вступило $n(\text{BaCl}_2) = 0,08 - 0,03 = 0,05 \text{ моль.}$

(6 баллов: 2 балла за расчет количества сульфата + 2 балла за вывод об избытке серной кислоты + 2 балла за количество хлорида бария, вступившего в реакцию с сульфатами).

Суммарное количество сульфатов калия и натрия равно количеству прореагировавшего с ними хлорида бария (0,05 моль), а их общая масса по условию составляет 7,74 г.

Пусть $x - n(\text{K}_2\text{SO}_4)$, $y - n(\text{Na}_2\text{SO}_4)$, тогда $m(\text{K}_2\text{SO}_4) = 174x$, $m(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 142y$.

Решаем систему из двух уравнений:

$$174x + 142y = 7,74;$$

$$x + y = 0,05.$$

$$x = 0,05 - y; \Rightarrow 174(0,05 - y) + 142y = 7,74; \Rightarrow 8,7 - 174y + 142y = 7,74; \Rightarrow 32y = 0,96; \Rightarrow$$

$$y = 0,03 \text{ моль}; x = 0,02 \text{ моль.}$$

Количество солей: $n(\text{K}_2\text{SO}_4) = 0,02 \text{ моль}$, $n(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 0,03 \text{ моль}$

$$\text{Массы солей: } m(\text{K}_2\text{SO}_4) = n * M = 0,02 * 174 = 3,48 \text{ г};$$

$$m(\text{Na}_2\text{SO}_4) = n * M = 0,03 * 142 = 4,26 \text{ г.}$$

Массовые доли солей в исходной смеси:

$$\omega(\text{K}_2\text{SO}_4) = 100 * 3,48 / 7,74 = 45,0 \%; \omega(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 100 * 4,26 / 7,74 = 55,0 \%.$$

(5 баллов. 3 балла за составление и решение системы уравнений, 1 балл за расчет масс солей, 1 балл за расчет массовых долей).

Ответ: $\omega(\text{K}_2\text{SO}_4) = 45,0 \%$, $\omega(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 55,0 \%$, $m(\text{SO}_3) = 2,56 \text{ г.}$

Итого 21 балл

3.2. На 170 г раствора хлорида анилина с концентрацией 20 % (по массе) подействовали 54,6 мл 20 % (по массе) раствора гидроксида натрия (плотность 1,22 г/мл). Органический продукт выделили из смеси и ввели в реакцию ацилирования с 40 г уксусного ангидрида.

а) Напишите уравнения протекающих реакций.


б) Определите массовую долю анилина в смеси, полученной после проведения реакции с гидроксидом натрия.

в) Вычислите массу N-фенилацетамида, образовавшегося в реакции с уксусным ангидридом.

г) Изобразите структурные формулы всех органических веществ, упомянутых в условии задачи и вопросах к ней.

Решение.

а) Уравнения реакций:



б) Определим массовую долю анилина в смеси, полученной после проведения реакции с гидроксидом натрия.

$$M([C_6H_5NH_3]Cl) = 129,5 \text{ г/моль};$$

$$m([C_6H_5NH_3]Cl) = 170 * 0,2 = 34 \text{ г}; n([C_6H_5NH_3]Cl) = 34 / 129,5 = 0,26 \text{ моль}.$$

$$M(NaOH) = 40 \text{ г/моль}; m_{p-p}(NaOH) = 54,6 * 1,22 = 66,6 \text{ г}; m(NaOH) = 66,6 * 0,2 = 13,32 \text{ г};$$

$$n(NaOH) = 13,32 / 40 = 0,33 \text{ моль (избыток)}.$$

$$M(C_6H_5NH_2) = 93 \text{ г/моль}; n(C_6H_5NH_2) = 0,26 \text{ моль}; m(C_6H_5NH_2) = 0,26 * 93 = 24,2 \text{ г};$$

$$w(C_6H_5NH_2) = 24,2 / (170 + 66,6) * 100\% = 10,3 \text{ \%};$$





в) Вычислим массу N-фенилацетамида, образовавшегося в реакции с уксусным ангидридом.

$$n(C_6H_5NH_2) = 0,26 \text{ моль};$$

$$M((CH_3CO)_2O) = 102 \text{ г/моль}; n((CH_3CO)_2O) = 40 / 102 = 0,39 \text{ моль – избыток}$$

$$M(C_6H_5NHC(O)CH_3) = 135 \text{ г/моль}; m(C_6H_5NHC(O)CH_3) = 0,26 * 135 = 35,1 \text{ г}.$$

в) Структурные формулы:



Система оценивания:

Уравнения реакций по 2 балла

*2*2 = 4 балла*

Вывод об избытке щелочи 2 балла, расчет массовой доли 3 балла

2+3 = 5 баллов

Вывод об избытке ангидрида 2 балла, расчет массы продукта 2 балла

2+2 = 4 балла

Структурные формулы органических веществ по 1,5 балла

*1,5*4 = 6 баллов*

Итого 19 баллов

Заключительный этап межрегиональной межвузовской олимпиады школьников

Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» 2015-2016 г.

Решения олимпиадных заданий по химии

10 класс

2 вариант

Часть 1. Разминка (общая оценка 20 баллов).

- 1.1.** Для водородных соединений элементов VIIA группы НЭ с уменьшением порядкового номера кислотные свойства **возрастают**, а восстановительные свойства **тоже возрастают..**
- 1.2.** При взаимодействии карбida кальция с водой образуется продукт, относящийся к классу **алкинов**, а при взаимодействии карбida алюминия с водой – к классу **алканов**.
- 1.3.** В атоме галлия в основном состоянии количество неспаренных электронов равно 1, а в ионе Ga^{3+} – 0.
- 1.4.** В газофазной реакции $2\text{NO}_2 = 2\text{NO} - Q$ установилось химическое равновесие. Если увеличить температуру, то равновесие сместится **вправо**, а если внести катализатор – **равновесие сохранится**.
- 1.5.** Фосфорная кислота H_3PO_4 имеет основность, равную **3**, а фосфорноватистая кислота H_3PO_2 – **1**.
- 1.6.** Среда водного раствора NH_4Cl **кислая**, а водного раствора FeSO_4 – **тоже кислая**.
- 1.7.** В соединении CrHPO_4 степень окисления хрома +2, а в соединении $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ +6.
- 1.8.** Агрегатное состояние Br_2 при комнатной температуре и атмосферном давлении **жидкость**, а его кристаллическая решетка в твердом состоянии **молекулярная**.
- 1.9.** Процесс, происходящий при взаимодействии алkenов с перманганатом калия в щелочной среде называется реакцией **Вагнера**, а органический продукт, образующийся в этой реакции, относится к классу **двухатомных спиртов (гликолей, диолов)**.
- 1.10.** При термическом разложении бромида аммония образуются **аммиак (NH_3)** и **бромоводород (HBr)**.

Система оценивания:

Каждый правильный ответ по 1 б

всего $1 \cdot 2 \cdot 10 = 20$ баллов.

Итого 20 баллов

Часть 2. Качественные задания (общая оценка 40 баллов).

- 2.1.** Имеется семь водных растворов, содержащих следующие соединения в одинаковой молярной концентрации: уксусная кислота, пропионат натрия, серная кислота, пропионовая кислота, ацетат натрия, хлороводород, хлорид натрия. Известно, что пропионовая кислота слабее уксусной кислоты.

Расположите эти растворы в ряд в порядке убывания значений pH. Ответ поясните.

Решение.

Самые высокие концентрации H^+ и, как следствие, самые маленькие значения pH (поскольку это **отрицательный** десятичный логарифм $[\text{H}^+]$) будут в растворах сильных кислот HCl и H_2SO_4 . Поскольку серная кислота при диссоциации дает два протона, а соляная один, самый низкий pH будет в растворе H_2SO_4 . Кислая среда будет еще в двух растворах слабых кислот – пропионовой и уксусной. Поскольку пропионовая кислота слабее уксусной кислоты, в ее растворе pH будет больше. В растворе NaCl – соли сильной кислоты и сильного основания – среда будет нейтральная, а в растворах солей сильного основания и слабых кислот CH_3COONa и $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COONa}$ среда будет слабощелочной (за счет гидролиза по аниону). Поскольку пропионовая кислота слабее

уксусной, то ее соль будет подвержена гидролизу в большей степени, и рН в растворе пропионата натрия будет больше, чем в растворе ацетата натрия. Получаем следующий порядок убывания значений рН:



Система оценивания:

Правильное положение каждого раствора в ряду по 1 б, верное пояснение места каждого раствора в ряду по 1 б (если перепутано направление ряда, то снимается 4 б; если сумма получается < 0, то выставляется 0) $1*7+1*7 = 14$ баллов.

Итого 14 баллов



2.2. Произойдет ли химическое взаимодействие с растворителем при раздельном помещении твердых веществ NH_4NO_3 , K_2SO_3 , Cu, ZnS, Al, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$:

- а) в разбавленную хлороводородную кислоту; б) в водный раствор гидроксида калия;
- в) в концентрированную азотную кислоту?


Ответы подтвердите уравнениями реакций. Если вещество не взаимодействует с растворителем, то обязательно укажите это.

Решение.



а) Не взаимодействуют с разбавленной HCl: NH_4NO_3 , Cu, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$.



б) Не взаимодействуют с NaOH: K_2SO_3 , Cu, ZnS.



в) Не взаимодействуют с HNO_3 (конц.): NH_4NO_3 , Al.



Система оценивания:


За верное указание об отсутствии взаимодействия по 0,5 балла,

за уравнения реакций по 1 баллу

$0,5*8+1*10 = 14$ баллов.

Итого 14 баллов

2.3. Расшифруйте схему превращений (изобразите структурные формулы и напишите названия органических соединений A – E).



Назовите механизмы реакций превращения B в C и C в D

Решение.

A	$\text{CH}_3 - \text{CHBr} - \text{CH}_3$	2-бромпропан
B	$\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$	пропанол-2, изопропанол

C		изопропилбензол, кумол, 1-метилэтилбензол, 2-фенилпропан
D		2-бром-2-фенилпропан
E		2-фенилпропен

B → C – электрофильное замещение

C → D – свободно-радикальное замещение

Система оценивания:

*Структурные формулы соединений А-Е по 1 баллу,
названия по 1 баллу*

*1*5+1*5 = 10 баллов;*

Названия механизмов по 1 баллу

*1*2 = 2 балла.*

Итого 12 баллов.

Часть 3. Расчетные задачи (общая оценка 40 баллов).

3.1. К раствору, содержащему 3,245 г смеси хлорида калия и хлорида натрия, добавили 124,8 мл 10 %-ного раствора нитрата серебра (плотность раствора равна 1,09 г/мл). Выпавший осадок отфильтровали. К фильтрату (профильтрованному раствору) добавили 16 мл соляной кислоты с концентрацией 2 моль/л, получив еще одну порцию такого же осадка, масса которого составила 4,305 г.

а) Напишите уравнения проведенных реакций.

б) Вычислите массу и объем хлороводорода (при н.у.), необходимый для приготовления израсходованной соляной кислоты.


в) Установите массовые доли солей в исходной смеси.

Решение.

а) Выпавший осадок – хлорид серебра, по условию задачи его отделяют фильтрованием:
 $\text{KCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl} \downarrow + \text{KNO}_3; \text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3.$

В фильтрате могут присутствовать: непрореагировавшие хлорид калия и хлорид натрия (если нитрат серебра в недостатке), нитрат серебра (если он взят в избытке) и образовавшиеся нитрат калия и нитрат натрия.

В реакции с соляной кислотой получился такой же осадок:



(3 балла: по 1 баллу за каждое уравнение реакции).

б) Определим массу и объем хлороводорода, необходимый для приготовления израсходованной соляной кислоты. Количество HCl равно $0,016 \cdot 2 = 0,032$ моль, следовательно, масса хлороводорода составит $0,032 \cdot 36,5 = 1,168 \approx 1,17$ г, его объем при н.у. $0,032 \cdot 22,4 = 0,7168 \approx 0,72$ л.

(3 балла. По 1,5 балла за определение массы и объема хлороводорода).

в) Количество AgNO₃, содержавшегося в исходном растворе:

$$n(\text{AgNO}_3) = 0,1 \cdot 124,8 \cdot 1,09 / 170 = 0,08 \text{ моль.}$$

(2 балла).

В реакции с соляной кислотой получился осадок хлорида серебра, следовательно, нитрат серебра был взят в избытке, а хлориды при первом сливании прореагировали полностью.

(2 балла за установление избытка нитрата серебра)

Количество хлорида серебра, получившегося в результате реакции с соляной кислотой:

$$n(\text{AgCl}) = 4,305 / 143,5 = 0,03 \text{ моль.}$$

Количество HCl посчитано в п. б и равно 0,032 моль, следовательно, соляная кислота взята в избытке по отношению к оставшемуся в растворе нитрату серебра.

Тогда $n(\text{AgNO}_{3\text{(ост)}}) = n(\text{AgCl}) = 4,305 / 143,5 = 0,03 \text{ моль.}$

Следовательно, 0,03 моль нитрата серебра осталось в фильтрате, а в реакцию с хлоридами вступило $n(\text{AgNO}_3) = 0,08 - 0,03 = 0,05 \text{ моль.}$

(6 баллов: 2 балла за расчет количества хлорида серебра + 2 балла за вывод об избытке соляной кислоты + 2 балла за количество нитрата серебра, вступившего в реакцию с хлоридами).

Суммарное количество хлоридов калия и натрия равно количеству прореагировавшего с ними нитрата серебра (0,05 моль), а их общая масса по условию составляет 3,245 г.

Пусть x – n(KCl), y – n(NaCl), тогда m(KCl) = 74,5x, m(NaCl) = 58,5y.

Решаем систему из двух уравнений:

$$74,5x + 58,5y = 3,245;$$

$$x + y = 0,05.$$

$$x = 0,05 - y; \Rightarrow 74,5(0,05 - y) + 58,5y = 3,245; \Rightarrow 3,725 - 74,5y + 58,5y = 3,245; \Rightarrow$$

$$16y = 0,48; \Rightarrow y = 0,03 \text{ моль}; x = 0,02 \text{ моль.}$$

Количество солей: n(KCl) = 0,02 моль, n(NaCl) = 0,03 моль

Массы солей: m(KCl) = n * M = 0,02 * 74,5 = 1,49 г;

m(NaCl) = n * M = 0,03 * 58,5 = 1,755 г.

Массовые доли солей в исходной смеси:

$$\omega(\text{KCl}) = 100 * 1,49 / 3,245 = 45,9 \%; \omega(\text{NaCl}) = 100 * 1,755 / 3,245 = 54,1 \%.$$

(5 баллов. 3 балла за составление и решение системы уравнений, 1 балл за расчет масс солей, 1 балл за расчет массовых долей).

Ответ: $\omega(\text{KCl}) = 45,9 \%, \omega(\text{NaCl}) = 54,1 \%, m(\text{HCl}) = 1,17 \text{ г}, V(\text{HCl}) = 0,72 \text{ л.}$


Итого 21 балл

3.2. На 194 г раствора хлорида анилина с концентрацией 20 % (по массе) подействовали 56 мл 20 % (по массе) раствора гидроксида натрия (плотность 1,22 г/мл). Органический продукт выделили из смеси и ввели в реакцию ацилирования с 38 г уксусного ангидрида.

- а) Напишите уравнения протекающих реакций.
 б) Определите массовую долю анилина в смеси, полученной после проведения реакции с гидроксидом натрия.
 в) Вычислите массу N-фенилацетамида, образовавшегося в реакции с уксусным ангидридом.
 г) Изобразите структурные формулы всех органических веществ, упомянутых в условии задачи и вопросах к ней.

Решение.

- а) Уравнения реакций:



- б) Определим массовую долю анилина в смеси, полученной после проведения реакции с гидроксидом натрия.

$$M([\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3]\text{Cl}) = 129,5 \text{ г/моль};$$

$$m([\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3]\text{Cl}) = 194 * 0,2 = 38,8 \text{ г}; n([\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3]\text{Cl}) = 38,8 / 129,5 = 0,3 \text{ моль.}$$

$$M(\text{NaOH}) = 40 \text{ г/моль}; m_{\text{p-p}}(\text{NaOH}) = 56 * 1,22 = 68,32 \text{ г}; m(\text{NaOH}) = 68,32 * 0,2 = 13,66 \text{ г};$$

$$n(\text{NaOH}) = 13,66 / 40 = 0,34 \text{ моль (избыток).}$$

$$M(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2) = 93 \text{ г/моль}; n(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2) = 0,3 \text{ моль}; m(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2) = 0,3 * 93 = 27,9 \text{ г};$$

$$w(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2) = 27,9 / (194 + 68,32) * 100\% = 10,6 \%;$$




- в) Вычислим массу N-фенилацетамида, образовавшегося в реакции с уксусным ангидридом.

$$n(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2) = 0,3 \text{ моль};$$

$$M((\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}) = 102 \text{ г/моль}; n((\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}) = 38 / 102 = 0,37 \text{ моль – избыток}$$

$$M(\text{C}_6\text{H}_5\text{NHC(O)CH}_3) = 135 \text{ г/моль}; m(\text{C}_6\text{H}_5\text{NHC(O)CH}_3) = 0,3 * 135 = 40,5 \text{ г.}$$

- в) Структурные формулы:



Система оценивания:

Уравнения реакций по 2 балла

*2*2 = 4 балла*

Вывод об избытке щелочи 2 балла, расчет массовой доли 3 балла

2+3 = 5 баллов

Вывод об избытке ангидрида 2 балла, расчет массы продукта 2 балла

2+2 = 4 балла

Структурные формулы органических веществ по 1,5 балла

*1,5*4 = 6 баллов*

Итого 19 баллов