

## 6 класс

1. Словосочетание «три слога» описывает само себя, потому что в нем действительно три слога. Найдите такое числительное, чтобы словосочетание, состоящее из него и слова «буква» в правильном падеже («буква», «буквы» или «букв»), тоже описывало само себя.

**Решение.** Десять букв.

□

2. Как-то ночью часы (со стрелками) сломались. Часовая стрелка пошла вдвое быстрее, а минутная — вдвое медленнее, чем они шли изначально. Андрюша проснулся, когда часовая стрелка указывала на 6, а минутная — на 12. Могли ли часы сломаться в полночь?

**Решение.** Допустим, что часы сломались в полночь. До момента, когда Андрюша проснулся, прошло чётное число часов — ведь минутная стрелка сделала целое число оборотов, а каждый оборот она теперь делает за два часа. Но тогда часовая стрелка должна указывать на число, делающееся на 4, ведь она идёт вдвое быстрее обычной. Поэтому на 6 она указывать не могла. Значит, и часы сломаться в полночь не могли.

□

3. Можно ли в каждую клетку шахматной доски поставить ладью, коня или слона так, чтобы ладьи били только коней, кони — только слонов, а слоны — только ладей?

**Решение.** Нельзя. Рассмотрим три случая.

- На клетке А1 стоит ладья. Тогда на клетке А2 должен быть конь, на С1 — слон, на В2 — ладья, на С2 — конь, и этот конь бьёт ладью на А1, чего не должно быть.
- На клетке А1 стоит конь. Тогда на С2 стоит слон, на В3 — ладья, а её бьёт конь на А1.
- На А1 стоит слон. Тогда на В2 — ладья, на А2 и В1 — кони, на С1 — слон, на В2 — ладья, которую бьёт конь В1.

□

4. В школе в день Святого Валентина мальчики дарили валентинки девочкам, и наоборот. Каждый мальчик подарил пяти девочкам валентинки с признанием в любви. Девочки же оказались гораздо скромнее: каждая подарила валентинки с признанием в любви всего четырём мальчикам. Пять школьников (три Валентины и два Валентина) получили поровну валентинок, а все остальные школьники — по две валентинки. Докажите, что мальчиков и девочек в школе поровну.

**Решение.** Пусть в классе  $m$  мальчиков и  $d$  девочек, и пусть Валентины получили по  $k$  писем. Тогда, так как количество посланных валентинок равно количеству полученных,

$$\begin{cases} 5m = 3k + 2(d - 3) \\ 4d = 2k + 2(m - 2). \end{cases}$$

Умножим первое уравнение на 3, второе — на 2, и вычтем их друг из друга, получая

$$10m - 12d = 4d - 6m,$$

откуда  $16m = 16d$ , то есть  $m = d$ .

□

**5.** Натуральное число  $n$  таково, что сумма четырёх его некоторых различных натуральных делителей (возможно, включая само это число) равна  $2n$ . Чему может быть равна сумма четырёх наименьших натуральных делителей этого числа? Перечислите все варианты ответа и докажите, что других нет.

**Решение.** Могут быть суммы 10, 11 и 12.

Докажем, что делители, дающие в сумме  $2n$  — это  $n$ ,  $n/2$ ,  $n/3$  и  $n/6$ .

В самом деле, если нет делителя  $n$ , то наибольшая возможная сумма равна

$$\frac{n}{2} + \frac{n}{3} + \frac{n}{4} + \frac{n}{5} < 2n.$$

Если нет делителя  $n/2$ , то максимальная сумма равна

$$n + \frac{n}{3} + \frac{n}{4} + \frac{n}{5} < 2n$$

Если нет делителя  $n/3$ , то максимальная сумма равна

$$n + \frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \frac{n}{5} < 2n.$$

Ну и оставшийся делитель — это

$$2n - n - \frac{n}{2} - \frac{n}{3} = \frac{n}{6}.$$

Значит, у числа  $n$  есть делители 1, 2, 3, 6. Ещё могут быть (а могут и не быть) делители 4 и 5. Тогда сумма наименьших делителей может быть равна  $1+2+3+4 = 10$  (например, для  $n = 12$ ),  $1 + 2 + 3 + 5 = 11$  (для  $n = 30$ ) и  $1 + 2 + 3 + 6 = 12$  (для  $n = 6$ ).

□

**6.** Каждый мальчик дружит с 5 девочками, а все девочки — с разным числом мальчиков. Какое наименьшее количество детей может быть в этой компании?

**Решение.** Если есть девочка, которая ни с кем не дружит, откинем её (количество детей уменьшится, а условие задачи сохранится).

Пусть у нас  $m$  мальчиков и  $d$  девочек. Проведём отрезок между мальчиком и девочкой, если они дружат. Тогда от мальчиков проведено  $5m$  отрезков, а от девочек не менее  $\frac{d(d+1)}{2}$  отрезков. В самом деле, упорядочим девочек по возрастанию количества знакомств; тогда первая девочка дружит не менее чем с одним мальчиком, вторая не менее чем с двумя, и т. д. Заметим также, что отсюда следует неравенство  $m \geq d$  (последняя девочка дружит не менее чем с  $d$  мальчиками, а значит, мальчиков хотя бы  $d$ ).

Тогда

$$\frac{d(d+1)}{2} \geq 5m \geq 5d,$$

откуда  $d \geq 9$  и  $m \geq 9$ . Пример на 9 мальчиков и 9 девочек строится легко: пусть девятая девочка знает всех мальчиков, восьмая — всех, кроме первого, первая — только первого мальчика, седьмая — кроме второго и третьего, вторая — только второго и третьего, и т. д. □

**7.** По одиннадцатикилометровой круговой трассе ездит много машин с постоянной скоростью 120 км/ч. В одном злополучном месте дороги стоит электронный полицейский. В каждый момент его жезл может находиться в одном из двух положений: поднятом или опущенном. Если машина проезжает мимо электронного полицейского с опущенным жезлом, она мгновенно сбрасывает скорость до 60 км/ч, а через минуту мгновенно разгоняется обратно. Если же жезл поднят, машина мгновенно останавливается, а через минуту срывается с места с первоначальной скоростью. Электронным полицейским управляет программист, который не видит расположения машин на дороге. Докажите, что программист может записать такую последовательность команд полицейского (сколько минут стоять с поднятым жезлом, затем — сколько с опущенным, и т. д.), чтобы сразу после последней команды все машины на трассе остановились.

**Решение.** Если полицейский стоит с опущенным жезлом, то любая машина делает полный круг за 6 минут: одну минуту она едет со скоростью 60 км/ч (т. е. проезжает 1 км), а остальное время — со скоростью 120 км/ч (т. е. проезжает 10 км за 5 минут).

Рассмотрим процедуру: электронный полицейский поднимает жезл и через минуту его опускает. В этот момент следующий за полицейским километр нет никаких машин (те машины, которые могли бы там находиться, остановлены поднятым жезлом). Затем полицейский ждёт с опущенным жезлом 6 минут — за это время все машины сделают полный круг и вернуться на те же места, т. е. за полицейским снова будет километровый пустой участок. Теперь полицейский снова поднимет жезл на минуту и снова его опустит — теперь за ним образовался трёхкилометровый пустой участок. Пусть полицейский повторит ту же процедуру ещё четыре раза и снова подождёт 6 минут. Тогда за ним образуется свободный 11-километровый участок, т. е. все машины окажутся прямо перед ним; он поднимает жезл и всех их останавливает. □